Piridostigmina bromuro, tableta, 60 mg, vía oral, código IGSS: 903

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la miastenia grave, íleo paralitico.

Reacciones adversas: Efectos colinérgicos, debilidad, hipotensión, cambios en el EKG, perdida de la conciencia, convulsiones, mareo, tromboflebitis, urticaria, arritmia, laringoespasmo, bradicardia, crisis colinérgica.

Precauciones de uso: Se debe utilizar con precaución en pacientes con epilepsia, asma, bradicardia, oclusión coronaria reciente, vagotonía, hipertiroidismo, arritmias cardiacas y ulcera péptica.
Los pacientes con enfermedades cardiovasculares tienen más riesgo a sufrir complicaciones cardiacas.
Se debe utilizar dosis menores en pacientes que tienen una tasa aumenta de absorción intestinal, como el uso concomitante de drogas anticolinérgicas.
Las crisis colinérgicas se caracterizan al igual que la miastenia gravis por debilidad muscular extrema, es importante diferenciar entre ambas.
Si se evidencian síntomas colinérgicos se debe descontinuar la terapia.
Puede causar reacciones de hipersensibilidad incluyendo anafilaxis.
Se debe utilizar con precaución en adultos mayores.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Obstrucción mecánica del tracto gastrointestinal o urinario.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.