Tiotropio Bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o cápsulas para inhalación, 18 mcg con dispositivo para inhalación, 20 ml, Vía inhalación, código IGSS: 10516

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Está indicado como tratamiento broncodilatador de mantenimiento para aliviar los síntomas en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Reacciones adversas: Infección del tracto respiratorio superior, boca seca, sinusitis, dolor abdominal, reacción alérgica, angina de pecho (incluida la angina de pecho agravada), catarata, dolor en el pecho (inespecífico), constipación, depresión, dispepsia, afonía, edema, epistaxis, reflujo gastroesofágico, infección de herpes, hipercolesterolemia, hiperglucemia, infección, laringitis, dolor de pierna, moniliasis, mialgia, parestesia, faringitis, erupción, rinitis, dolor esquelético, estomatitis (incluida la estomatitis ulcerosa), infección del tracto urinario, vómitos**,** angioedema, fibrilación, taquicardia supraventricular, retención urinaria, informes poscomercialización**,** broncoespasmo, glositis, deshidración insomnio.

Precauciones de uso: No para uso agudo; no es un medicamento de rescate.
Reacciones de hipersensibilidad inmediata (p. ej., angioedema, picazón, erupción); suspender el tratamiento inmediatamente.
Cápsula que no debe tragarse; debe administrarse únicamente mediante inhalación oral.

Empeoramiento del glaucoma de ángulo estrecho y de la retención urinaria, obstrucción del cuello de la vejiga.
Potencial de broncoespasmo paradójico.
Hiperplasia prostática.
Lavarse las manos después de manipular las cápsulas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a alguno de los componentes u otros derivados de atropina.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.