Tobramicina, solución oftálmica, 0.3%, frasco gotero, 5 ml, vía tópico ocular, código IGSS: 135

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de enfermedades externas causadas por infecciones del ojo y sus anexos causadas por bacterias susceptibles.

Reacciones adversas: Las reacciones adversas con frecuencia no definida incluyen toxicidad ocular localizada e hipersensibilidad, que incluyen aumento del lagrimeo, picazón y edema del párpado y eritema conjuntival (<3%) reacción de sensibilidad, queratitis puntiforme.

Precauciones de uso: Puede ocurrir hipersensibilidad desde efectos locales hasta reacciones generalizadas y sobrecrecimiento de organismos no susceptibles; no se debe utilizar lentes de contacto si presenta signos o síntomas de infección ocular y no topar el aplicador a la mucosa ocular o cualquier superficie debido a posible contaminación.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo, aminoglucósidos o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.