Vitamina D (alfacalcidol), cápsula 1 mcg, Vía oral, código IGSS: 448

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Alteraciones del metabolismo del calcio y del fósforo debidas a una producción reducida de 1,25-dihidroxivitamina D en pacientes sometidos a hemodiálisis a largo plazo.

Reacciones adversas: Hipercalcemia, hiperfosfatemia, dolor y malestar abdominal, erupción cutánea, prurito, hipercalciuria. Confusión, cefalea, diarrea, vómitos, estreñimiento, náuseas, mialgia, empeoramiento de la función renal, nefrolitiasis, nefrocalcinosis, fatiga, astenia, malestar, calcinosis.

Precauciones de uso: Durante el tratamiento con alfacalcidol, deben monitorizarse regularmente los niveles séricos de calcio y fosfatos. Debe monitorizarse el producto calcio-fósforo, la fosfatasa alcalina y la PTH, según indicación clínica.
Puede producirse hipercalcemia, informar a los pacientes sobre los síntomas clínicos derivados de la hipercalcemia; anorexia, fatiga, náuseas y vómitos, estreñimiento o diarrea, poliuria, sudoración, cefalea, polidipsia, hipertensión, somnolencia y vértigo.
La hipercalcemia puede ser rápidamente corregida mediante la interrupción del tratamiento hasta normalización de los niveles plasmáticos de calcio (alrededor de una semana). Puede entonces reiniciarse el tratamiento con Alfacalcidol empleando una dosis reducida (mitad de la dosis previa), monitorizándose el calcio.
La hipercalcemia prolongada puede agravar la arterioesclerosis, la esclerosis de válvulas cardiacas o la nefrolitiasis y, por tanto, debe evitarse la hipercalcemia prolongada cuando se emplea Alfacalcidol en estos pacientes. Se ha observado deterioro transitorio o incluso prolongado de la función renal. Alfacalcidol debe

emplearse también con precaución en pacientes con calcificación del tejido pulmonar puesto que puede conllevar al desarrollo de alteraciones cardiacas.
En pacientes con enfermedad ósea renal o función renal severamente reducida, pueden emplearse quelantes de fósforo simultáneamente con alfacalcidol, para prevenir el aumento de fósforo sérico y la calcificación metastásica potencial.
Alfacalcidol debe emplearse con precaución en pacientes con enfermedades granulomatosas como sarcoidosis, en los que la sensibilidad a la vitamina D está incrementada debido a una mayor actividad de hidroxilación.
El empleo concomitante de glucósidos cardiacos en presencia de hipercalcemia debida a la administración de vitamina D incrementa el riesgo de sufrir arritmias cardiacas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a alguno de los componentes, hipercalcemia. **Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.