Ciprofloxacina mas fluocinolona, solución ótica, 3 mg/ ml - 0.25 mg/ ml, Frasco gotero 10 ml, Vía tópico ótico, código IGSS: 1962

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la otitis media aguda con tubos de timpanostomía en pacientes pediátricos (de 6 meses en adelante) debido a Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Pseudomonas aeruginosa.

Reacciones adversas: Otorrea, exceso de tejido de granulación, infección de oído, prurito de oído, trastorno de la membrana timpánica, hinchazón auricular, trastorno del equilibrio.

Precauciones de uso: Descontinuar ante el primer signo o síntoma de hipersensibilidad, el uso prolongado puede producir sobrecrecimiento de hongos y bacterias no susceptibles. Otorrea continua o recurrente después de un ciclo de tratamiento o dos o más episodios dentro de los 6 meses, se recomienda una evaluación adicional para excluir una condición subyacente como colesteatoma, cuerpo extraño o tumor.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida al fármaco o excipientes, infecciones virales del canal auditivo externo, incluidas infecciones por varicela y herpes simple e infecciones óticas por hongos.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.