Ácido acetilsalicílico, tableta, 100 mg, vía oral, código IGSS: 603

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso:
Profilaxis de: Infarto de miocardio o reinfarto de miocardio en pacientes con angina de pecho inestable y para prevenir la recurrencia del mismo en pacientes con historia de infarto de miocardio.
Prevención de la oclusión del bypass aortocoronario.
Tromboflebitis, flebotrombosis y riesgo de trombosis arteriales.
Tromboembolismo post-operatorio en pacientes con prótesis vasculares biológicas o con shunts arteriovenosos.
Tratamiento de ataques isquémicos transitorios en varones con isquemia cerebral transitoria para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. Estas indicaciones requieren siempre un control médico.

Reacciones adversas: Angioedema, broncoespasmo, alteración del sistema nervioso central, problemas dermatológicos, dolor gastrointestinal, ulceración, sangrado, hepatotoxicidad, pérdida de la audición, náuseas, inhibición de la agregación plaquetaria, hemólisis prematura, edema pulmonar (inducido por salicilatos, no cardiogénico), erupción, daño renal, tinnitus, urticaria, vómitos.

Precauciones de uso: Riesgo de hemorragia que puede producirse en caso de cirugía menor (por ejemplo, extracción dental). La interrupción del tratamiento antes de la cirugía debe determinarse caso por caso.
Posible aparición de síndrome de Reye por lo que en niños y adolescentes no se recomienda su uso, únicamente cuando otras medidas han fallado y por estricta

recomendación médica. Riesgo de daño gastrointestinal cuando se administra en conjunto con alcohol, pudiendo provocar hemorragia gástrica.

Riesgo de hemorragia gastrointestinal o úlceras en dosis altas sobre todo en pacientes ancianos y adolescentes.

El tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos se asocia con la aparición de hemorragia, ulceración y perforación del tramo digestivo alto.

Estos episodios pueden aparecer en cualquier momento a lo largo del tratamiento, sin síntomas previos y en pacientes sin antecedentes de trastornos gástricos.

Evitarse el tratamiento concomitante con medicamentos que puedan aumentar el riesgo de hemorragias, especialmente digestivas altas, tales como corticoides, antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos del tipo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes.

Administrarse bajo estrecha supervisión médica en caso de:

Hipersensibilidad a otros antiinflamatorios/antirreumáticos

Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

Rinitis.

Hipertensión arterial.

Antecedentes de úlcera gastroduodenal, hemorragia gastrointestinal o gastritis.

Asma.

Metrorragias o menorragias.

Insuficiencia renal.

Insuficiencia hepática leve o moderada.

Insuficiencia cardíaca.

Evitar el tratamiento concomitante con levotiroxina y salicilatos.

A las altas dosis utilizadas en reumatología (dosis antiinflamatorias), se recomienda controlar los signos y síntomas de sobredosis. Se deberá reevaluar el tratamiento en caso de tinnitus, audición reducida y mareos.

Modifica el ácido úrico sérico y se desaconseja en el caso de gota.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la aspirina o los antiinflamatorios no esteroideos (urticaria inducida por aspirina o asma intolerante a la aspirina).
Alergia al colorante de tartrazina
Absolutas: Úlceras gastrointestinales sangrantes, anemia hemolítica por deficiencia de piruvato quinasa y glucosa-6-fosfato deshidrogenasa hemofilia, diátesis hemorrágica, hemorroides, madre lactante, pólipos nasales asociados con asma, sarcoidosis, trombocitopenia, colitis ulcerosa
Relativas: Apendicitis, asma (bronquial), diarrea crónica, obstrucción de la salida intestinal (para formulaciones con recubrimiento entérico), deshidratación, gastritis erosiva, hipoparatiroidismo.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.