Fosfomicina trometamol, granulado para solución oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco, vía oral, código IGSS: 10587.

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de infecciones del tracto urinario no complicadas (cistitis aguda) en mujeres debido a cepas susceptibles de Escherichia coli y Enterococcus fecalis. Si se produce persistencia o reaparición de bacteriuria después del tratamiento deben seleccionarse otros agentes terapéuticos.

Reacciones adversas: Anorexia, diarrea, malestar epigástrico, dolor de cabeza, náuseas, erupción, vómitos, mareo, somnolencia, fatiga, prurito.

Precauciones de uso: Se ha notificado diarrea asociada a Clostridium difficile con el uso de casi todos los antibacterianos, hasta dos meses después de la administración y puede variar en severidad desde diarrea leve hasta colitis fatal. De ocurrir, suspender el tratamiento.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida al principio activo.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.