# Loperamida clorhidrato, cápsula o tableta o comprimido o gragea, 2 mg, vía oral, código IGSS: 219

**Dosis:** Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

**Indicaciones de uso:** Tratamiento sintomático de la diarrea aguda inespecífica en adultos y niños mayores de 12 años.

**Reacciones adversas:** Mareo, Fatiga, Dolor abdominal, Constipación, Náuseas, Boca seca, Angioedema, Erupciones ampollosas, Flatulencia, Erupción.
Pancreatitis, Prolongación del intervalo QT/QTc, Torsades de Pointes, otras arritmias ventriculares, paro cardíaco, síncope y muerte.

**Precauciones de uso:** Puede causar somnolencia o mareos, que pueden afectar la capacidad física para operar maquinaria pesada o tareas que requieran agudeza mental.
Se informaron reacciones de hipersensibilidad, que incluyen anafilaxia, erupción cutánea, urticaria y casos raros de síndrome de Steven Johnson o necrólisis epidérmica tóxica.
Suspender si no se observa mejoría dentro de las 48 horas en pacientes con diarrea aguda, los síntomas empeoran o se desarrolla hinchazón o abultamiento abdominal.
Suspenda inmediatamente si se desarrolla estreñimiento, dolor o distensión abdominal, sangre en las heces o íleo; no utilizar cuando se debe evitar la inhibición del peristaltismo (es decir, debido a la posibilidad de íleo, megacolon o megacolon tóxico).

Suspenda el tratamiento si se presentan síntomas de distensión abdominal en pacientes con SIDA; Casos de megacolon tóxico reportados con colitis infecciosa, como resultado de patógenos virales o bacterianos.

Úselo con precaución en pacientes con insuficiencia hepática debido a una reducción del metabolismo de primer paso; monitorear signos de toxicidad del SNC.

El uso de dosis superiores a las recomendadas o el abuso de loperamida puede provocar eventos adversos cardíacos graves, incluida la prolongación del intervalo QT. Torsades de Pointes u otras arritmias ventriculares, síncope y paro cardíaco; en casos de abuso, los individuos suelen utilizar otras drogas junto con loperamida en un intento de aumentar su absorción y penetración a través de la barrera hematoencefálica, inhibir el metabolismo de la loperamida y mejorar sus efectos eufóricos.

La deshidratación, particularmente en pacientes pediátricos menores de 6 años, puede influir aún más en la variabilidad de la respuesta a la loperamida.

Evite la loperamida en combinación con medicamentos o productos a base de hierbas que se sabe que prolongan el intervalo QT, incluidos antiarrítmicos de Clase 1A (p. ej., quinidina, procainamida) o Clase III (p. ej., amiodarona, sotalol), antipsicóticos (p. ej., clorpromazina, haloperidol, tioridazina, ziprasidona), antibióticos (p. ej., moxifloxacina) o cualquier otro fármaco que se sepa que prolonga el intervalo QT (p. ej., pentamidina, metadona)

Evite administrar terapia a pacientes con factores de riesgo de prolongación del intervalo QT, incluidos pacientes con síndrome congénito de QT largo, con antecedentes de arritmias cardíacas u otras afecciones cardíacas, pacientes de edad avanzada y aquellos con anomalías electrolíticas.

Los pacientes con antecedentes de ritmo cardíaco anormal o enfermedad hepática deben consultar a su proveedor de atención médica antes de usar el producto; tomar más de lo indicado puede causar problemas cardíacos graves o la muerte

Dosis potencialmente tóxica en pacientes <6 años: 0,4 mg/kg.

En pacientes con diarrea, especialmente en ancianos y en niños, se puede presentar depleción de fluidos y electrolitos.
En tales casos, la medida terapéutica más importante es la administración de fluidos apropiados y la reposición de electrolitos. En la diarrea aguda, si no se observa mejoría clínica en 48 horas, se interrumpirá el tratamiento.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad, diarrea con sangre, fiebre alta, diarrea infecciosa, colitis pseudomembranosa.
Pacientes en los que se debe evitar el estreñimiento.
Dolor abdominal sin diarrea.
Evite su uso como terapia primaria en disentería aguda (heces con sangre y fiebre alta, colitis ulcerosa aguda, enterocolitis bacteriana [causada por Salmonella, Shigella y Campylobacter), colitis pseudomembranosa asociada con el uso de antibióticos).
Edad <2 años.
En general, no debe administrarse cuando se quiera evitar la inhibición del peristaltismo debido a un posible riesgo de secuelas significativas, como íleo, megacolon y megacolon tóxico.

**Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

**Embarazo y lactancia:** Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

**Referencia:** Adaptado de Formulario Terapéutico.