Sitagliptina Fosfato, comprimido recubierto, 100 mg, vía oral, código IGSS: 10534

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 cuando las medidas dietéticas, el ejercicio físico y la pérdida de peso no son suficientes para controlar la glicemia como monoterapia, en combinación oral doble o triple o insulina.

Reacciones adversas: Hipoglicemia cuando se usa en combinación con insulina o glimepirida, nasofaringitis, infección respiratoria superior, cefalea.

Precauciones de uso: Se ha reportado pancreatitis aguda, incluyendo pancreatitis necrotizante y hemorrágica, si se sospecha de la misma se debe interrumpir inmediatamente el fármaco.
Es importante determinar la función renal antes de iniciar la administración de sitagliptina y se debe monitorear de manera periódica.
Se han reportado casos severos de hipersensibilidad incluyendo síndrome de Steve-Johnson, se debe detener el tratamiento de manera temprana si hay sospecha de alguna reacción alérgica seria.
Se ha observado falla cardiaca en los usuarios de inhibidores de la DPP-4, se recomienda monitorizar a pacientes con riesgo cardiovascular e interrumpir el tratamiento si aparecen síntomas.
Se han reportado casos de hipoglicemia con el uso concomitante de sitagliptina e insulina o sulfonilureas. Se recomienda utilizar una dosis más baja de estos medicamentos para reducir el riesgo de hipoglicemia.
La sitagliptina se excreta por vía renal.

Se ha reportado penfigoide bulloso en usuarios de inhibidores de la DPP-4, incluyendo sitagliptina. Se debe interrumpir en caso de sospecha o aparición de ampollas o erosiones.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al compuesto.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.