Cilostazol, tableta o cápsula de liberación prolongada, 100 mg, vía oral, código IGSS: 10532

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Reducción de los síntomas de la claudicación intermitente, demostrada por un aumento de la distancia de la marcha.

Reacciones adversas: Dolor de cabeza, diarrea, heces anormales, infección, rinitis, faringitis, mareos, palpitaciones, edema periférico, dolor de espalda, dispepsia, dolor abdominal, taquicardia, aumento de la tos, mialgia, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio, hematemesis, equimosis, sangre en el ojo, epistaxis, hemoptisis, náuseas.

Precauciones de uso: Riesgos de taquicardia, palpitaciones, taquiarritmia o hipotensión. Riesgos de exacerbaciones de angina de pecho o infarto de miocardio en pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica.
Se ha informado obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en pacientes con tabique interventricular en forma de sigmoide.
Riesgos de trombocitopenia o leucopenia que progresan a agranulocitosis monitorización de plaquetas y recuentos de glóbulos blancos
Evite el uso en pacientes con trastornos hemostáticos o sangrado patológico activo.

Contraindicaciones: Insuficiencia cardíaca congestiva de cualquier gravedad.
Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.