Dasatinib, tableta 100 mg, vía oral, código IGSS: 10860

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de pacientes adultos con:
Leucemia mieloide crónica con cromosoma filadelfia positivo recién diagnosticada en fase crónica.
Leucemia mieloide crónica con cromosoma filadelfia positivo en fase blástica crónica, acelerada o mieloide o linfoide con resistencia o intolerancia a la terapia previa, incluido imatinib.
Leucemia linfoblástica aguda con cromosoma filadelfia positivo con resistencia o intolerancia a la terapia previa.
Tratamiento de pacientes pediátricos de 1 año de edad y mayores con: Leucemia linfoblástica aguda con cromosoma filadelfia positivo en fase crónica.
Leucemia linfoblástica aguda con cromosoma filadelfia positivo recién diagnosticada en combinación con quimioterapia.

Reacciones adversas: Retención de líquidos, incluida insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar, derrame pleural, diarrea, dolor de cabeza, hemorragia, fatiga, pirexia, erupción cutánea, infección, náuseas, disnea, tos, dolor, dolor abdominal, vómitos, anorexia, artralgia, astenia, estreñimiento, mareos, dolor musculoesquelético, pérdida de peso, dolor en el pecho, neuropatía, mialgia, distensión abdominal, arritmia, escalofríos, neumonía, prurito, aumento de peso, anemia, neutropenia febril, trombocitopenia, inflamación de las mucosas.

Precauciones de uso: Las tabletas no deben masticarse, cortarse o triturarse, deben administrarse completas.

Posibles eventos hemorrágicos como trombocitopenia grave, neutropenia y anemia. Precaución con uso concomitante con medicamentos que inhiben la función plaquetaria o anticoagulantes. Monitoree con hemogramas completos periódicamente.

Retención de líquidos, a veces grave, incluidos los derrames pleurales.

Posible toxicidad cardiovascular por lo que debe monitorearse para detectar signos y síntomas.

Puede aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión arterial pulmonar que puede ser reversible al suspender el tratamiento. Considerar riesgo inicial y evaluar a los pacientes para detectar signos y síntomas durante el tratamiento.

Precaución en pacientes que tienen o pueden desarrollar prolongación del intervalo QT.

Se han informado reacciones dermatológicas como casos individuales de reacciones mucocutáneas graves.

Se ha informado síndrome de lisis tumoral. Mantener hidratación adecuada y niveles correctos de ácido úrico antes de iniciar la terapia.

Puede causar daño fetal. Asesorar a los pacientes del riesgo potencial para el feto y utilizar métodos eficaces de anticoncepción.

Posible epífisis, fusión retardada, osteopenia, retraso del crecimiento y ginecomastia en pacientes pediátricos en crecimiento y desarrollo.

Evaluar la función hepática antes del inicio del tratamiento y mensualmente a partir de entonces o según esté clínicamente indicado. Vigilar la función hepática cuando este combinado con quimioterapia que se sabe que está asociada con disfunción hepática.

Contraindicaciones: Ninguna.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.