Linagliptina, tabletas recubiertas, 5 mg, vía oral, código IGSS: 10859

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso:
Tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 cuando las medidas dietéticas, el ejercicio físico y la pérdida de peso no son suficientes para controlar la glicemia, como monoterapia o en combinación.

Reacciones adversas: Nasofaringitis, hiperlipidemia, tos, hipertrigliceridemía, ganancia de peso, hipoglicemia.

Precauciones de uso: El uso en combinación con un secretador de insulina, como sulfonilurea, se ha asociado a mayor riesgo de hipoglicemia en comparación con el placebo. Se recomiendo utilizar una dosis baja de sulfilurea cuando se utilicen en combinación.
La rifampicina puede disminuir la concentración de linagliptina, se recomienda utilizar una terapia alternativa.
Se ha reportado casos de hipersensibilidad severa incluyendo anafilaxis, artralgia y angioedema.
Se ha observado falla cardiaca en los usuarios de inhibidores de la DPP-4, se recomienda monitorizar a pacientes con riesgo cardiovascular e interrumpir el tratamiento si aparecen síntomas.
Se ha reportado penfigoide bulloso en usuarios de inhibidores de la DPP-4, incluyendo linagliptina.
Se debe interrumpir en caso de sospecha o aparición de ampollas o erosiones.

Se ha reportado pancreatitis aguda, incluyendo pancreatitis necrotizante y hemorrágica, si se sospecha de la misma se debe interrumpir inmediatamente el fármaco.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al compuesto. Diabetes Mellitus I. Cetoacidosis diabética.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.