Oximetazolina clorhidrato, solución nasal, 0.05%, frasco gotero, 10- 15 ml, Vía tópico nasal, código IGSS: 1113

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Alivio temporal de la congestión nasal en resfrío común, inflamación de los senos paranasales, sinusitis, fiebre del heno y otras alergias de las vías respiratorias altas (rinitis alérgica).

Reacciones adversas: Frecuencia no definida: Insomnio, dolor de cabeza, incendio, escozor, sequedad, estornudos, congestión de rebote.

Precauciones de uso: Se debe evaluar la situación clínica antes de utilizar este medicamento en los pacientes con: enfermedades cardiovasculares incluyendo angina e hipertensión, feocromocitoma, porfiria o rinitis crónica, diabetes mellitus, enfermedades de la tiroides, hipertrofia prostática o alguna enfermedad de la próstata con dificultad al orinar (ya que tienen mayor riesgo a padecer de retención urinaria), tratamiento simultáneo con antidepresivos tricíclicos y otros medicamentos que aumentan la presión arterial.
No debe ser utilizado durante más de 3 días consecutivos para evitar efecto de rebote y rinitis inducida por el medicamento.No debería administrase a pacientes que reaccionan fuertemente a los simpaticomiméticos con signos de insomnio, vértigo, etc.
La eficacia de los agentes descongestionantes rinológicos puede disminuir (taquifilaxia) con el uso prolongado y la dosificación excesiva. Esto puede llevar a utilizar dosis más altas, utilizarlo con mayor frecuencia, lo cual puede dar como

resultado el uso permanente. Si ocurre un uso prolongado o dosificación excesiva, el tratamiento debe suspenderse de inmediato.
Este medicamento no se debe administrar a niños menores de 6 años. Los niños pueden ser especialmente propensos a la absorción sistémica de la oximetazolina y a sus reacciones adversas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.