Fluconazol, tableta o cápsula, 150 mg, , vía oral, código IGSS: 124

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de: Candidiasis vaginal causada por cándida.
Candidiasis orofaríngea y esofágica, infecciones del tracto urinario, peritonitis e infecciones sistémicas por Cándida, incluida la candidemia, candidiasis diseminada y neumonía.
Meningitis criptocócica.
Profilaxis para disminuir la incidencia de candidiasis en pacientes sometidos a trasplante de médula ósea que reciben quimioterapia citotóxica y/o radiación.

Reacciones adversas: dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, diarrea, erupción, vómitos.

Precauciones de uso: Administrarse con precaución a pacientes con insuficiencia hepática, asociado con casos raros de toxicidad hepática grave, la hepatotoxicidad podría ser reversible al suspender la terapia. Suspender si se desarrollan signos y síntomas clínicos consistentes con una enfermedad hepática.
Posible anafilaxia.
Trastornos exfoliativos de la piel han sido informados, en algunos casos (enfermedades subyacentes) pueden ser graves.
Pacientes con infecciones fúngicas profundas que desarrollan erupciones durante el tratamiento debe monitorearse de cerca y el medicamento debe suspenderse si las lesiones progresan.
Prolongación del intervalo QT. Los pacientes con hipopotasemia e insuficiencia cardíaca avanzada tienen un mayor riesgo de aparición de arritmias ventriculares

potencialmente mortales y torsade de pointes. Administrarse con precaución a los pacientes con estos síntomas potencialmente proarrítmicos.
El uso concomitante de fluconazol y eritromicina tiene el potencial de aumentar el riesgo de cardiotoxicidad (prolongación del intervalo QT, torsade de pointes) y, en consecuencia, muerte súbita
Administrarse con precaución en pacientes con disfunción renal debido a la posible insuficiencia suprarrenal.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Coadministración de otros fármacos se sabe que prolongan el intervalo QT y que se metabolizan a través de la enzima CYP3A4, como la eritromicina, la pimozida y la quinidina.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.