# Rivaroxaban, tableta, 20 mg, vía oral, código IGSS: 10856

**Dosis:** Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

**Indicaciones de uso:** Reducción del riesgo de accidente cerebrovascular y embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular.
Tratamiento de la trombosis venosa profunda.
Tratamiento de la embolia pulmonar:
Reducción del riesgo de recurrencia de trombosis venosa profunda y/o embolia pulmonar en pacientes adultos con riesgo continuo de trombosis venosa profunda y/o embolia pulmonar después de completar un tratamiento inicial con una duración mínima de 6 meses.
Profilaxis de la trombosis venosa profunda que puede provocar embolia pulmonar en pacientes adultos después de someterse a una cirugía de reemplazo de rodilla o cadera.
Profilaxis del tromboembolismo venoso y el tromboembolismo venoso relacionado a muerte durante la hospitalización y post alta hospitalaria en pacientes adultos ingresados por un cuadro agudo y que están en riesgo de complicaciones tromboembólicas debido a movilidad restringida moderado o grave y otros factores de riesgo de tromboembolismo venoso y sin alto riesgo de sangrado.
En combinación con aspirina para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares importantes (muerte cardiovascular, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular) en pacientes adultos con enfermedad arterial coronaria.
En combinación con aspirina para reducir el riesgo de eventos trombóticos vasculares mayores (infarto de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico, isquemia aguda de las extremidades y amputación de una etiología vascular), en pacientes adultos con enfermedad arterial periférica incluidos los pacientes que

recientemente se sometieron a un procedimiento de revascularización de las extremidades inferiores debido a una enfermedad arterial periférica sintomática.
Tratamiento del tromboembolismo venoso y la reducción en el riesgo recurrente de tromboembolismo venoso en pacientes pediátricos desde el nacimiento hasta menos de 18 años después de al menos 5 días de tratamiento anticoagulante parenteral inicial.
Tromboprofilaxis en pacientes pediátricos a partir de los 2 años de edad con cardiopatías congénitas que se han sometido al procedimiento de Fontan.

**Reacciones adversas:** Hematoma, dolor de espalda, secreción de heridas, dolor abdominal, mareos, prurito, dolor en extremidad, insomnio, ansiedad, ampolla, fatiga, espasmo muscular, síncope, espasmo muscular, depresión, sangrado mayor, fibrilación auricular, profilaxis de trombosis venosa profunda, tratamiento de trombosis venosa profunda, profilaxis de tromboembolismovenoso.

**Precauciones de uso:** Puede causar hemorragias graves y mortales.
Precaución en mujeres embarazadas debido al potencial de hemorragia obstétrica y/o entrega emergente.
No se recomienda en pacientes que han tenido reemplazo de válvula aórtica transcatéter.
Mayor riesgo de trombosis en pacientes con Síndrome antifosfolípido triple positivo por lo que no se recomienda el uso.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Sangrado patológico activo.
Pacientes que han tenido reemplazo de válvula aórtica transcatéter.

**Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

**Embarazo y lactancia:** Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

**Referencia:** Adaptado de Formulario Terapéutico.