Liraglutide, solución inyectable 6 mg/ ml en dispositivo prellenado 3 ml, vía subcutánea, código 10578.

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de pacientes con diabetes mellitus II, en combinación con metformina, sulfonilureas, tiazolidindionas, terapia combinada o insulina basal.

Reacciones adversas: Nausea, diarrea, vómitos, estreñimiento, dolor de cabeza, constipación, cefalea, generación de anticuerpos antilaraglutida, reacción en el sitio de inyección, urticaria, infección respiratoria superior, infección del tracto urinario, mareo, sinusitis, nasofaringitis, dolor de espalda, hipertensión, hipoglicemia, pancreatitis, carcinoma tiroideo papilar, hiperplasia de Células C tiroideas, deshidratación, alteración de la función renal, reacciones de hipersensibilidad, reacciones alérgicas, cáncer de mama, neoplasma colorrectal, alteraciones hepatobiliares.

Precauciones de uso: Se ha reportado aumento en la incidencia de tumores de celular C tiroideas en ratas expuestas al medicamento en comparación del uso de placebo.
El uso en paciente con historia personal o familiar de Síndrome de Neoplasias Endocrinas Múltiples.
No es un medicamento sustituto de la insulina.
No se recomienda en pacientes con enfermedad inflamatorio gastrointestinal y gastroparesia diabética, ya que se asocia a reacciones adversas gastrointestinales.
No se recomienda su uso en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1.

El uso concomitante con sulfonilurea o insulina aumenta la incidencia de hipoglicemia, se recomienda utilizar una dosis menor cuando se usa en combinación.
Se ha reportado pancreatitis aguda, incluyendo pancreatitis necrotizante y hemorrágica, si se sospecha de la misma se debe interrumpir inmediatamente el fármaco.
Puede causar alteración de la función renal incluyendo aumento de la creatinina y falla renal aguda.
Puede causar reacciones de hipersensibilidad.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Historia personal o familiar de carcinoma medular tiroideo o antecedente de síndrome de neoplasia endócrina múltiple tipo 2.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.