Simvastatina, tableta, 20 mg, vía oral, código IGSS: 2119

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Para reducir el riesgo de mortalidad total al reducir el riesgo de muerte por enfermedad coronaria, no fatal; infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, y la necesidad de procedimientos de revascularización coronaria y no coronaria en adultos con cardiopatía coronaria establecida, enfermedad cerebrovascular, enfermedad periférica enfermedad vascular y/o diabetes, que tienen un alto riesgo de eventos de enfermedad coronaria.
Como complemento de la dieta para reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C): en adultos con hiperlipidemia primaria; en adultos y pacientes pediátricos mayores de 10 años con hipercolesterolemia familiar con heterocigosis.
Como complemento de otras terapias que reducen el colesterol de lipoproteínas de baja densidad para reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad en adultos con hipercolesterolemia familiar con homocigosis.
Como complemento de la dieta para el tratamiento de adultos con: disbetalipoproteinemia primaria e hipertrigliceridemia.

Reacciones adversas: Elevación de creatina fosfocinasa (>3x límite superior normal), estreñimiento, infección de las vías respiratorias superiores, flatulencia, aumento de transaminasas (>3x límite superior normal), dolor de cabeza, mialgia, eccema, vértigo, dolor abdominal, mialgia, miopatía, artralgia, artritis, eosinofilia, escalofríos, angioedema, rabdomiolisis, dolor abdominal.

Precauciones de uso: Riesgo de miopatía y rabdomiólisis en pacientes de 65 años o mayores, hipotiroidismo no controlado, insuficiencia renal, uso concomitante con otros medicamentos y dosis más altas de simvastatina; pacientes chinos pueden

tener mayor riesgo de miopatía. Suspender si se producen niveles marcadamente elevados de creatina cinasa o se diagnostica o sospecha miopatía.
Suspenda temporalmente en pacientes experimentando una condición aguda o grave con alto riesgo de desarrollar insuficiencia renal secundaria a rabdomiolisis.
Indique a los pacientes que informen de inmediato dolor muscular, sensibilidad o debilidad, particularmente si se acompaña por malestar o fiebre.
Riesgo de miopatía necrotizante inmunomediada.
Reportes raros de insuficiencia hepática fatales y no fatales se han producido.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la simvastatina.
Enfermedad hepática activa o elevación inexplicable de transaminasas.
Inhibidores potentes de CYP3A4 (p. ej., itraconazol, ketoconazol, eritromicina, claritromicina, posaconazol, voriconazol, inhibidores de la proteasa del VIH, cobicistat, nefazodona), gemfibrozilo, ciclosporina y danazol.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.