Atorvastatina, tableta, 20 mg, vía oral, código IGSS: 433

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Reducción del riesgo de:
Infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, procedimientos de revascularización y angina en adultos con múltiples factores de riesgo para cardiopatía coronaria, pero sin que sea clínicamente evidente.
Infarto de miocardio y accidente cerebrovascular en adultos con diabetes mellitus tipo 2 con múltiples factores de riesgo de cardiopatía coronaria, pero sin evidencia clínica de cardiopatía coronaria.
Infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular fatal y no fatal, procedimientos de revascularización, hospitalización por insuficiencia cardíaca congestiva y angina en adultos con cardiopatía coronaria clínicamente evidente
Como complemento de la dieta para reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad en:
Adultos con hiperlipidemia primaria.
Adultos y pacientes pediátricos de 10 años o más con hipercolesterolemia heterocigota familiar
Como complemento de otras terapias para reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, o solo si dichos tratamientos no están disponibles, para reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad en adultos y pacientes pediátricos de 10 años o más con hipercolesterolemia familiar homocigota.
Como complemento de la dieta para el tratamiento de adultos con: disbetalipoproteinemia primaria e hipertrigliceridemia.

Reacciones adversas: Diarrea, nasofaringitis, artralgia, insomnio, infección del tracto urinario, náuseas, dispepsia, aumento de transaminasas, espasmos

musculares, dolor musculoesquelético, mialgia, dolor en las extremidades, dolor faringolaríngeo.

Precauciones de uso: Riesgo de miopatía y rabdomiólisis en pacientes de 65 años o mayores, hipotiroidismo no controlado, insuficiencia renal, uso concomitante con otros medicamentos y dosis más altas de atorvastatina. Suspender si se producen niveles marcadamente elevados de creatina cinasa o se diagnostica o sospecha miopatía.
Suspenda temporalmente en pacientes experimentando una condición aguda o grave con alto riesgo de desarrollar insuficiencia renal secundaria a rabdomiolisis.
Indique a los pacientes que informen de inmediato dolor muscular, sensibilidad o debilidad, particularmente si se acompaña por malestar o fiebre.
Riesgo de miopatía necrotizante inmunomediada.
Reportes raros de insuficiencia hepática fatales y no fatales se han producido.
Evaluar parámetros de enzimas hepáticas antes del inicio de la terapia. Si la lesión hepática es grave con clínica aparecen síntomas y/o hiperbilirrubinemia o ictericia, suspenda inmediatamente.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la atorvastatina.
Insuficiencia hepática aguda o cirrosis descompensada.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.