Lactobacillus Reuteri Protectis, Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml, vía oral, código IGSS: 10392

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Suplemento alimenticio con probióticos, que contiene la bacteria ácido láctica patentada L. reuteri Protectis (L. reuteri DSM 17938), y ayuda a las bacterias beneficiosas a mantener el equilibrio natural del intestino.
Tratamiento de alteraciones digestivas, tales como diarreas de diversa etiología, cólicos infantiles, constipación.

Reacciones adversas: A la fecha no se encuenran informes de seguridad clínica o problemas de tolerancia reportados en estudios en adultos, niños e infantes.
Aunque no se han observado reacciones adversas con este medicamento, en algunos casos se han descrito las siguientes reacciones respecto a Lactobacilos, si bien, no se ha podido determinar si la aparición de 3 de 5 estos efectos se deben a la terapia con Lactobacilos acidófilos o a una terapia concomitante con antibióticos.
Trastornos gastrointestinales:
Muy raros (<1/ 10.000): Eructos, constipación, vómitos, gases.
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo; Raros (≥ 1/10.000 a <1 /1.000): Rash.
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:
Muy raros (<1/ 10.000): Hipo.

Precauciones de uso: No se reportan en Medscape
No hay restricciones para mujeres embarazadas o lactantes.

No hay reportes en la literatura sobre potencial mutagénico u otros efectos genotóxicos causados por L. reuteri u otras cepas LAB. Por el contrario, hay reportes considerando a LABs como agentes antimutagénicos.

No hay reportes en la literatura sobre efectos de carcinogenicidad asociada con el uso clínico de cepas LAB. Por el contrario, hay varios reportes considerando a L. acidophilus y otros probióticos LAB como agentes antioncogénicos.
No debe usarse más de dos días con fiebre alta, ni en niños menores de tres años sin consultar con el médico.
Debe administrarse con precaución en pacientes inmunodeprimidos puesto que esta población es más susceptible de sufrir infecciones sistémicas.
Dado el riesgo de deshidratación que comporta una diarrea, especialmente en niños y en ancianos, este tratamiento se complementara con la ingestión abundante de líquidos o de rehidratación cuando se crea necesario.
Se recomienda también establecer una dieta astringente.
No hay reportes en la literatura sobre toxicidad fetal y otros efectos adversos reproductivos causados por el consumo de L. reuteri. En contraste, los microorganismos son una parte de la flora natural saludable de la vagina. Además, la evaluación sobre este tema se ha considerado innecesarios.

Contraindicaciones: Pacientes inmunodeprimidos, perforación de la pared gastrointestinal.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.