Nateglinida, comprimido 120 mg, vía oral, código IGSS: 2075.

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de pacientes con diabetes mellitus II no controlada con dieta y ejercicio o con monoterapia con metfromina a dosis máxima.

Reacciones adversas: Aumento del ácido úrico, mareo, artropatía, síndrome pseudogripal, ganancia de peso, hipoglicemia, diarrea, nausea.

Precauciones de uso: No debe utilizarse en combinación con un secretor de insulina (ej. Gliburida)
No debe utilizarse como sustituto de metformina como monoterapia sino como tratamiento complementario.
Puede causar hipoglicemia severa en pacientes ancianos, malnutridos, con insuficiencia adrenal, pituitaria o hepática, pacientes con insuficiencia renal grave
El padecimiento de hipoglicemia puede aparecer de repente, los síntomas pueden ser menos pronunciados en pacientes con diabetes mellitus con varios años de diagnóstico, neuropatía diabética, pacientes utilizando un bloqueador del sistema nervioso simpático o en pacientes que padecen hipoglicemias recurrentes.
El control de la glucemia puede alterarse es situaciones de estrés como fiebre, traumatismo, infección o cirugía. Se recomienda utilizar insulina en estos casos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Diabetes Mellitus I. Cetoacidosis diabética. Embarazo y lactancia. Insuficiencia hepática grave

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.