Rosuvastatina, tableta o cápsula, 20 mg, vía oral, código IGSS: 10581

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y revascularización arterial procedimientos en adultos sin enfermedad coronaria establecida que tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular según la edad, y al menos un factor de riesgo adicional.
Como complemento de la dieta para:
Reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad en adultos con hiperlipidemia primaria.
Reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad y retrasar la progresión de aterosclerosis en adultos.
Reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad en adultos y pacientes pediátricos mayores de 8 años con hipercolesterolemia familiar heterocigota.
Como complemento de otras terapias para reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, o solo, en caso de que los tratamientos no estén disponibles, para reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad en adultos y pacientes pediátricos de 7 años o más con hipercolesterolemia familiar homocigota.
Como complemento de la dieta para el tratamiento de adultos con: disbetalipoproteinemia primaria e hipertrigliceridemia.

Reacciones adversas: Mialgia, artralgia, faringitis, dolor de cabeza, mialgia, náuseas, astenia, estreñimiento, mareos, artralgia, creatina fosfocinasa aumentada, diabetes mellitus, dolor abdominal, alanina aminotransferasa aumentada, enfermedad similar a la gripe, infección del tracto urinario, ictericia, miopatía, rabdomiolisis.

Precauciones de uso: Riesgo de miopatía y rabdomiólisis en pacientes de 65 años o mayores, hipotiroidismo no controlado, insuficiencia renal, uso concomitante con otros medicamentos y dosis más altas de atorvastatina. Suspender si se producen niveles marcadamente elevados de creatina cinasa o se diagnostica o sospecha miopatía.

Suspenda temporalmente en pacientes experimentando una condición aguda o grave con alto riesgo de desarrollar insuficiencia renal secundaria a rabdomiolisis.

Indique a los pacientes que informen de inmediato dolor muscular, sensibilidad o debilidad, particularmente si se acompaña por malestar o fiebre.

Riesgo de miopatía necrotizante inmunomediada.

Reportes raros de insuficiencia hepática fatales y no fatales se han producido.

Evaluar parámetros de enzimas hepáticas antes del inicio de la terapia. Si la lesión hepática es grave con clínica aparecen síntomas y/o hiperbilirrubinemia o ictericia, suspenda inmediatamente.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco o excipientes.

Insuficiencia hepática aguda o cirrosis descompensada (incluidas elevaciones persistentes inexplicables de pruebas hepáticas).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.