Fenofibrato, cápsula de liberación prolongada, 250 mg, vía oral, código IGSS: 2004

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Como complemento de la dieta y otro tratamiento no farmacológico (como ejercicio, pérdida de peso) para lo siguiente:
Tratamiento de hipertrigliceridemia grave con o sin colesterol HDL bajo.
Hiperlipidemia mixta cuando las estatinas están contraindicadas o no se toleran.
Hiperlipidemia mixta en pacientes de elevado riesgo cardiovascular además de una estatina cuando los triglicéridos y el colesterol HDL no se controlan debidamente.

Reacciones adversas: Signos y síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia); aumento de transaminasas; aumento de los niveles de homocisteína en sangre, cefalea; tromboembolismo (embolismo pulmonar, trombosis venosa profunda); pancreatitis; colelitiasis; hipersensibilidad cutánea (p.ej. rash, prurito, urticaria); Trastornos musculares (p.ej. mialgia, miositis, espasmos y debilidad musculares); Disfunción sexual; aumento de creatinina en sangre.

Precauciones de uso: Se pueden observar hipercolesterolemias secundarios relacionadas al tratamiento farmacológico con diuréticos, agentes β-bloqueantes, estrógeno, progestágenos, anticonceptivos orales combinados, agentes inmunosupresores e inhibidores de la proteasa. En estos casos es preciso determinar si su hiperlipidemia es primaria o secundaria (los eventuales altos niveles lipídicos pueden ser causados por estos agentes terapéuticos).

Se han observado aumentos de transaminasas en algunos pacientes, se recomienda un control cada 3 meses durante los primeros 12 meses de tratamiento y a partir de entonces periódicamente. Suspender si se supera al triple del valor normal.
Posible aparición de pancreatitis.
Toxicidad muscular, incluyendo raramente casos de rabdomiolisis, en pacientes en tratamiento con fibratos y otros hipolipemiantes con o sin insuficiencia renal. El riesgo de toxicidad muscular puede aumentar cuando el medicamento se administra en asociación con otros fibratos o con inhibidores de la HMG-CoA reductasa, especialmente en caso de existir trastornos musculares anteriores; reservar para pacientes que presenten grave dislipidemia asociada a alto riesgo cardiovascular sin antecedentes de afecciones musculares.
Precaución en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada.

Contraindicaciones: Insuficiencia hepática (incluida cirrosis biliar y una anormalidad de la función hepática inexplicable persistente.
Enfermedad conocida de la vesícula biliar.
Insuficiencia renal grave (tasa de filtración glomerular estimada < 30 mL/min/1.73 m^2).
Pancreatitis crónica o aguda con la excepción de pancreatitis aguda debida a hipertrigliceridemia grave.
Reacciones conocidas de fotosensibilidad o fototoxicidad durante el tratamiento con fibratos o ketoprofeno.
Hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.