Metronidazol, tableta o cápsula, 500 mg, vía oral, código IGSS: 148

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de *Trichomonas vaginalis* en mujeres y hombres cuando se ha confirmado la presencia del patógeno. Tratamiento de pacientes asintomáticos con infección por *Trichomonas vaginalis* en mujeres cuando el organismo está asociado con endocervicitis, cervicitis o erosión cervical.
Parejas sexuales asintomáticas de los pacientes tratados por infección con *Trichomonas vaginalis* deben recibir tratamiento simultáneamente si se ha encontrado que el organismo está presente, para prevenir reinfección de la pareja.
Tratamiento del amebiasis intestinal aguda (disentería amebiana) y absceso hepático amebiano.
Tratamiento de infecciones graves causadas por bacterias anaerobias susceptibles como:
Infecciones intraabdominales, incluyendo peritonitis, absceso intraabdominal y absceso hepático, causado por especies de bacteroides, incluido el grupo *Bacteroides fragilis* (b. fragilis, b. distasonis, b. ovatus, b. thetaiotaomicron, b. vulgatus), especies de clostridium, especies de eubacterium, especies de peptococcus y especies de peptostreptococcus.
Infecciones de la piel y de la estructura de la piel causadas por especies de bacteroides, incluidas el grupo *Bacteroides fragilis*, especie clostridium, especie peptococcus, peptostreptococcus especies y especies de fusobacterium.
Infecciones ginecológicas, incluyendo endometritis, endomiometritis, tubo-ovárico absceso e infección posquirúrgica del manguito vaginal, causadas por especies de bacteroides, incluidas el grupo *Bacteroides fragilis*, especie clostridium, especie peptococcus, especies de peptostreptococcus y especies de fusobacterium.

Septicemia bacteriana causada por especies de bacteroides, incluida la b. fragilis grupo y especie clostridium.
Infecciones de huesos y articulaciones (como terapia complementaria), causadas por especies de bacteroides incluyendo el grupo b. fragilis.
Infecciones del sistema nervioso central, incluidas meningitis y absceso, causado por especies de bacteroides, incluido el grupo b. fragilis.
Infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyendo neumonía, empiema y absceso pulmonar, causado por especies de bacteroides, incluido el grupo b. fragilis.
Endocarditis causada por especies de bacteroides, incluido el grupo b. fragilis.

Reacciones adversas: Pérdida de apetito, candidiasis, diarrea, mareo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, ataxia, orina oscura, reacción tipo disulfiram con etanol, lengua peluda, hipersensibilidad, neutropenia, sabor metálico, neuropatía, pancreatitis, convulsiones, tromboflebitis, xerostomía, encefalopatía, meningitis aséptica, neuropatía óptica, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, disminución de la libido.

Precauciones de uso: Han sido reportados Trastornos neurológicos severos, incluyendo encefalopatía, síntomas cerebelosos, ataques convulsivos, neuropatía periférica, neuropatía óptica y meningitis aséptica.
Los pacientes con insuficiencia hepática metabolizan metronidazol lentamente, con la consiguiente acumulación de metronidazol y aumento de las concentraciones plasmáticas.
Pacientes con enfermedad renal en etapa terminal pueden excretar metronidazol y metabolitos lentamente en la orina, lo que resulta en una acumulación significativa de metabolitos de metronidazol. Se recomienda monitorear los eventos adversos asociados al metronidazol.
Usarse con precaución en pacientes con evidencia o antecedentes de discrasia sanguínea. Se ha observado una leve leucopenia durante su administración.

Posibilidad de sobreinfecciones fúngicas, de presentarse síntomas prominentes de candidiasis proveer tratamiento con un agente candidácico.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al metronidazol u otros antimicrobianos nitroimidazoles (aunque se ha aplicado una desensibilización cautelosa).
Durante el primer trimestre del embarazo en pacientes con tricomoniasis.
Asociado con reacciones psicóticas en pacientes alcohólicos que estaban usando disulfiram al mismo tiempo. No administre metronidazol a pacientes que hayan tomado disulfiram en las últimas dos semanas.
Reacción al alcohol similar al disulfiram, incluyendo calambres abdominales, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y sofocos. Discontinuar consumo de alcohol o productos que contengan propilenglicol durante y durante al menos tres días después de la terapia con metronidazol.
Pacientes con Síndrome de Cockayne.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.