# Ácido Ursodesoxicolico, tableta o cápsula, 250 – 300 mg, vía oral, código IGSS: 1361

**Dosis:** Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

**Indicaciones de uso:** Disolución de cálculos biliares compuestos de colesterol en pacientes que tienen uno o más cálculos biliares radiotransparentes (radionegativos), preferiblemente con un diámetro no superior a 2 cm, en una vesícula biliar con buen funcionamiento.
Para quienes la cirugía no es una opción; en los cuales se ha demostrado una sobresaturación de colesterol mediante pruebas químicas en la bilis; antes y después de la disolución de cálculos biliares por ondas de choque (litotricia).
Para el tratamiento de una patología en la que los conductos biliares del hígado sufren daños y se produce una acumulación de bilis. Ello puede causar cicatrices en el hígado. El hígado no debería sufrir daños hasta el punto de no funcionar correctamente. Esta patología se denomina colangitis biliar primaria (CBP, también conocida como cirrosis biliar primaria).
Para el tratamiento de la enfermedad hepática asociada con la fibrosis quística en niños y adolescentes de 6-18 años.

**Reacciones adversas:** Heces blandas y sueltas o diarrea.
Muy raras (pueden afectar a menos de 1 de cada 10 000 pacientes): En el tratamiento de la colangitis biliar primaria: dolor intenso en la parte superior derecha del abdomen, empeoramiento grave de las cicatrices hepáticas, que se alivia parcialmente después de suspender el tratamiento; calcificación (endurecimiento de los cálculos biliares debido a la acumulación de calcio) de los cálculos biliares; ronchas (urticaria).

**Precauciones de uso:** En los primeros 3 meses de tratamiento, su médico debe supervisar su función hepática regularmente cada 4 semanas. Posteriormente, los controles deben llevarse a cabo cada 3 meses.
Si toma este medicamento para disolver cálculos biliares, su médico debe realizarle ecografías de la vesícula biliar después de 6 a 10 meses de tratamiento.
Si es mujer y toma este medicamento para disolver los cálculos biliares, debe utilizar métodos anticonceptivos no hormonales efectivos, ya que los anticonceptivos hormonales (píldora anticonceptiva) pueden contribuir a la formación de cálculos biliares.
Niños:
No hay ninguna restricción de edad para el uso de este medicamento salvo para fibrosis quística (de 6 a 18 años).

**Contraindicaciones:** Contraindicado en casos de hipersensibilidad al ácido ursodesoxicólico o a cualquier componente de la formulación. También está contraindicado en pacientes con o en riesgo de desarrollar cálculos radiopacos, calcificados o pigmentados, enfermedades inflamatorias de la vesícula, del tracto biliar o los intestinos. No debe administrarse en pacientes con insuficiencia renal, durante el embarazo y la lactancia. Los antiácidos, la colestiramina y el colestipol disminuyen la absorción de ursodiol (administrar 2 h antes o 2 h después), mientras que el clofibrato y los estrógenos disminuyen la eficacia del ursodiol.
Se recomienda vigilancia de las enzimas hepáticas.

**Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

**Embarazo y lactancia:** Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

**Referencia:** Adaptado de Formulario Terapéutico.