Colestiramina, polvo, sobre, 4 g, vía oral, código IGSS: 267

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento del hipercolesterolemia: reducción de niveles elevados de colesterol total y colesterol LDL en pacientes con hipercolesterolemia primaria, incluyendo hipercolesterolemia familiar, o secundaria como complemento a la dieta y a otros tratamientos cuando la respuesta a estas medidas es inadecuada.
Prurito asociado con obstrucción biliar parcial o cirrosis biliar primaria.
Diarrea causada por malabsorción de ácidos biliares asociada a enfermedad de Crohn, resección intestinal o vagotomía u otras situaciones que provoquen un exceso de ácidos biliares en el intestino.

Reacciones adversas: Eructos, constipación, erosión dental, diarrea, sangrado por úlcera duodenal, flatulencia, cálculos biliares, acidez, hipoprotrombinemia, malabsorción de vitaminas liposolubles, náuseas y vómitos, pancreatitis, irritación perianal, dolor rectal, esteatorrea, dolor de estómago, aumento o pérdida de peso.

Precauciones de uso: No deben administrarse otros fármacos por vía oral durante el periodo comprendido entre una hora antes y 4-6 horas después de la administración de Resincolestiramina por el riesgo de interacción.
Cuando se utiliza la colestiramina como terapia única no mejora la hipertrigliceridemia, pudiendo incluso elevar los triglicéridos en suero, por lo general de forma transitoria.
A dosis elevadas, la colestiramina puede interferir con la absorción normal de las grasas. También puede interferir con la absorción de vitaminas liposolubles de la

dieta (A, D, E y K); de ser a tiempos prolongados considerar administración de suplementos vitamínicos.
Con administraciones durante periodos de tiempo prolongado se ha observado también una reducción del folato sérico o eritrocitario.
El medicamento puede aumentar la excreción urinaria de calcio y, por tanto, y debido a la posible interferencia con la absorción de la Vitamina D puede aumentar el riesgo de osteoporosis.
Puede inducir o agravar el estreñimiento preexistente o condiciones relacionadas como las hemorroides; en pacientes con estreñimiento reducir dosis.
La colestiramina debe administrarse con precaución en pacientes con úlcera péptica activa o con historia previa de úlcera previa, ya que podría provocar una exacerbación.
Se recomienda realizar periódicamente controles séricos de colesterol y triglicéridos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a las resinas secuestrantes de bilis.
Obstrucción biliar completa.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.