Secnidazol, tableta, 500 mg, vía oral, código IGSS: 1112

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Amebiasis intestinal y amebiasis hepática.
Giardiasis.
Trichomoniasis vaginal.

Reacciones adversas: Nauseas, gastralgias, modificación del gusto (sabor metálico), glositis, estomatitis. Erupciones (urticaria). Leucopenia moderada y reversible, vértigos atóxicos y falta de coordinación, parestesias, polineuritis sensitivo motoras, dolor abdominal, vómitos, diarreas.

Precauciones de uso: Daño hepático severo: reducir la dosis diaria en 50 % o un tercio.
Evitar el consumo de alcohol, ya que puede ocurrir una reacción tipo disulfiram. Puede provocar calor, enrojecimiento, vómitos, taquicardia.
Administrar con cuidado en pacientes con antecedentes de enfermedad neurológica. Si existe tratamiento de más de 10 días, realizar pruebas clínicas y de laboratorio. Pacientes con diabetes mellitus.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los derivados del secnidazol.
Primer trimestre del embarazo. Sujetos con discrasia sanguínea. Enfermedad del sistema nervioso central. Daño hepático severo. Porfiria.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.