Propiltiouracilo, tableta 50 mg, vía oral, Código IGSS: 342.

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de hipertiroidismo, incluyendo enfermedad de Graves. Preparación para pacientes hipertiroideos para tiroidectomía. Adyuvante de terapia con radiación y yodo. Tratamiento de la tormenta tiroidea.

Reacciones adversas: Agranulocitosis, anemia aplásica, reacciones dermatológicas, hepatitis, poliartritis, fiebre, cefalea, vértigo, alopecia, eritema nodoso, dermatitis exfoliativa, rash, ulceras cutáneas, gota, ganancia de peso, constipación, perdida del gusto, granulopenia, leucopenia, trombocitopenia, inhibición de la mielopoyesis, fiebre medicamentosa, periarteritis, hipoprotrombinemia, sangrado, nefritis, glomerulonefritis, neumonitis intersticial, dermatitis exfoliativa, eritema nodoso, vasculitis, urticaria, nausea, vomito, molestia en epigastrio, artralgia, parestesias, perdida del gusto.

Precauciones de uso: Se ha reportado falla hepática aguda en pacientes pediátricos que consumen propiltiouracilo.
Se debe monitorear de cerca por signos y síntomas de daño hepático especialmente durante los primeros 6 meses después de iniciar la terapia. En caso de síntomas se debe descontinuar el tratamiento y obtener pruebas de función hepática.
Se ha observado el padecimiento de agranulocitosis en los primeros 3 meses de tratamiento, los pacientes deben reportar cualquier síntoma sugestivo de la enfermedad como fiebre o resequedad de garganta; leucopenia, trombocitopenia y anemia aplásica también pueden ocurrir; descontinuar el tratamiento si se sospecha de las mismas.

Los pacientes con síntomas de fiebre, resequedad de garganta, cefalea o malestar generalizado deben ser evaluados y se debe obtener un conteo de glóbulos blancos para determinar si existe un episodio de agranulocitosis.
Se han reportado casos de complicaciones severas incluyendo muerte asociado a vasculitis. Se debe detener el tratamiento si existe sospecha.
Reservar el uso del fármaco para los pacientes que no toleraron otros tratamientos.
Existe el riesgo de padecer hepatitis inmunoalérgica., aunque este es raro.
Se han reportado reacciones dermatológicas severas.
Vigilar a los pacientes en caso de fiebre y descontinuar en caso de fiebre sin origen aparente.
Se ha reportado falla renal aguda asociada a glomerulonefritis y nefritis intersticial.
Puede causar relapso, especialmente en fumadores.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.