Cloroquina fosfato, tableta, 250 mg, vía oral, código IGSS: 76

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento del paludismo no complicado debido a cepas susceptibles de P. falciparum, P.malariae, P. ovale y P.vivax. Profilaxis de la malaria en áreas geográficas donde la resistencia a la cloroquina no está presente. Tratamiento de la amebiasis extraintestinal.

Reacciones adversas: Maculopatía, degeneración macular, alteraciones visuales, nictalopía, visión escotomatosa con defectos de campo de tipo anillo paracentral y pericentral, escotomas típicamente temporales (p. ej., dificultad para leer con palabras que tienden a desaparecer, ver la mitad de un objeto, visión nublada y niebla delante de los ojos), opacidades corneales reversibles, urticaria, reacción anafiláctica (p. ej., angioedema), trastornos del oído y del laberinto: sordera de tipo nervioso, tinnitus, audición reducida en pacientes con daño auditivo preexistente, trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: trastornos sensoriomotores, miopatía o neuromiopatía del músculo esquelético, depresión de los reflejos tendinosos, conducción nerviosa anormal, hepatitis, aumento de las enzimas hepáticas, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales, trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: eritema multiforme, síndrome de Stevens Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, dermatitis exfoliativa, erupciones cutáneas pleomórficas, cambios en la pigmentación de la piel y las mucosas, erupciones similares al liquen plano, prurito, erupción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos (síndrome DRESS), fotosensibilidad, pérdida de cabello, pancitopenia, anemia aplásica, agranulocitosis reversible, trombocitopenia, neutropenia, anemia

hemolítica en pacientes con deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, convulsiones, cefalea leve y transitoria, polineuropatía, trastornos extrapiramidales agudos (p. ej., distonía, discinesia, protrusión de la lengua, tortícolis)
Trastornos neuropsiquiátricos: Psicosis, delirio, ansiedad, agitación, insomnio, confusión, alucinaciones, cambios de personalidad, depresión, comportamiento suicida, hipotensión, cambios en el electrocardiograma (en particular, inversión o depresión de la onda T con ensanchamiento del complejo QRS), miocardiopatía, arritmias cardíacas, trastornos de la conducción (p. ej., bloqueo de rama del haz de His/bloqueo auriculoventricular, prolongación del intervalo QT, torsade de pointes, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular), hipoglucemia.

Precauciones de uso: No es eficaz contra las cepas de Especies de Plasmodium resistentes a cloroquina o hidroxicloroquina.
La cloroquina no trata las formas hipnozoitas de Plasmodium en estadio hepático y, por lo tanto, no previene las recaídas de la malaria por P. vivax o P. ovale.
Pacientes tratados durante la terapia a largo plazo en dosis altas con cloroquina se ha informado cardiomiopatía que resulta en insuficiencia cardíaca, en algunos casos con desenlace fatal. Suspender si se desarrolla cardiomiopatía.
Se ha demostrado que la cloroquina causa hipoglucemia grave, incluida la pérdida del conocimiento que podría ser potencialmente mortal en pacientes tratados con o sin medicamentos antidiabéticos.
Se ha observado daño retinal irreversible en algunos pacientes que habían recibido cloroquina, por lo que se debe realizar un examen oftalmológico basal dentro del primer año de inicio del tratamiento con cloroquina y se recomienda suspenderla si se sospecha toxicidad ocular y el paciente debe ser observado de cerca dado que los cambios en la retina (y las alteraciones visuales) pueden progresar incluso después de la interrupción de la terapia.
Trastornos extrapiramidales agudos pueden ocurrir con cloroquina.
Todos los pacientes en terapia a largo plazo con cloroquina deben ser interrogados y examinados periódicamente, incluida la prueba de los reflejos de la rodilla y el

tobillo, para detectar cualquier evidencia de debilidad. Si se produce debilidad, suspenda el medicamento.
El uso en pacientes con psoriasis puede precipitar un ataque severo de psoriasis o en pacientes con porfiria podría exacerbarla.
Riesgo potencial de inducir mutaciones genéticas. Pacientes con daño auditivo previo. Pacientes con enfermedad hepática o alcoholismo o junto con fármacos hepatotóxicos conocidos debido a que el fármaco se concentra en el hígado.
La cloroquina puede aumentar el riesgo de convulsiones en pacientes con antecedentes de epilepsia.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la cloroquina, 4-aminoquinolonas. Psoriasis, porfiria, cambios en la retina o en el campo visual.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.