Iloprost, solución para inhalación por nebulizador, 10 mcg/ ml, vial o ampolla, 2 ml, vía inhalada, código IGSS: 1985

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar para mejorar un criterio de valoración compuesto que consiste en tolerancia al ejercicio, síntomas y falta de deterioro.

Reacciones adversas: Enrojecimiento, tos, hipotensión, náuseas, dolor de cabeza, dolor de mandíbula, trismo, palpitaciones, síncope, insomnio, vómitos, dolor de lengua, dolor de espalda, calambres musculares, gammaglutamiltransferasa elevada, hemoptisis, neumonía, insuficiencia renal, broncoespasmo, hipersensibilidad, taquicardia supraventricular.

Precauciones de uso: Se ha observado hipotensión que conduce a síncope; monitorear signos vitales.
No debe administrarse en pacientes con presión arterial sistólica inferior a 85 mmHg.
Riesgo de hipertensión venosa pulmonar, suspender si se produce edema pulmonar.
Pacientes con antecedentes de vía aérea hiperreactiva la enfermedad puede ser más sensible a broncoespasmo.

Contraindicaciones: Ninguna bien documentada.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.