Metimazol, tableta 5 mg, vía oral, código IGSS: 345.

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de hipertiroidismo. Tratamiento de crisis tirotóxicas. Preparación para pacientes hipertiroideos para tiroidectomía. Adyuvante de terapia con radiación y yodo. Tratamiento profiláctico en pacientes con hipertiroidismo subclínico.

Reacciones adversas: Agranulocitosis, alopecia, anemia aplásica, reacciones dermatológicas, hepatotoxicidad, vasculitis, neuritis, poliartritis, prurito, inflamación de las glándulas salivales, pigmentación de la piel, trombocitopenia, urticaria, vértigo.

Precauciones de uso: Puede causar hipoprotrombinemia y sangrado, vigilar de cerca antes de un procedimiento quirúrgico.
Durante el tratamiento prolongado puede causar hipotiroidismo, se debe monitorear los niveles de T4 libre y TSH y ajustar la dosis si es necesario buscando mantener al paciente en estado eutiroideo. Se prefiere utilizar durante periodos cortos y bajo una adecuada monitorización.
Se ha reportado mielotoxicidad, especialmente durante las primeras semanas del tratamiento o luego de su reintroducción. Se recomienda realizar un hemograma de rutina antes y después del inicio del tratamiento. Los pacientes deben reportar cualquier síntoma sugestivo de la enfermedad como fiebre o resequedad de garganta; leucopenia, trombocitopenia y anemia aplásica también pueden ocurrir; descontinuar el tratamiento si se sospecha de las mismas.
Los derivados de la tioamida pueden reducir la radiosensibilidad del tejido tiroideo.

Se ha reportado hepatitis, descontinuar el tratamiento si se observa elevación de las enzimas hepáticas.
Descontinuar en caso de fiebre de origen desconocido.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Alteración moderada o grave del hemograma. Colestasis no causada por hipertiroidismo. Daño previo de la medula ósea luego de la utilización de tiamazol o carbimazol. Pacientes con historia de pancreatitis aguda asociada al uso de tiamazol.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.