Ácido fólico, tableta, 5 mg, vía oral, código IGSS: 648

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Para prevenir y tratar la deficiencia de ácido fólico en mujeres embarazadas como medida preventiva de defectos del tubo neural (espina bífida, anencefalia, encefalocele) y otros problemas congénitos. Es especialmente recomendado para mujeres con antecedentes de hijos o fetos con estas deficiencias en el tubo neural, durante las cuatro semanas previas a la concepción y los primeros tres meses de gestación.
El fármaco se usa para tratar la deficiencia de ácido fólico asociada con condiciones como anemias megaloblásticas, alcoholismo y síndromes de malabsorción.

Reacciones adversas: Broncoespasmo, eritema, malestar, prurito, erupción, leve rubor.

Precauciones de uso: Las mujeres que han tenido un hijo (o feto) con un defecto en el tubo neural (DTN) como espina bífida, anencefalia o encefalocele, pueden reducir el riesgo para futuros embarazos al incluir un suplemento de ácido fólico en su dieta. Se recomienda planificar cuidadosamente el embarazo futuro después de consultar a un médico, y si no está contraindicado, recibe un tratamiento oral con 5 mg al día de ácido fólico durante cuatro semanas antes de la concepción y los tres primeros meses del embarazo.
Para las mujeres embarazadas epilépticas que estén tomando medicamentos antiepilépticos (especialmente ácido valproico y carbamacepina), se recomienda administrar dosis similares de ácido fólico a las recomendadas para prevenir DTN en mujeres con antecedentes, debido a una mayor incidencia de DTN en este grupo comparada con la población general.

Interferencia con pruebas diagnósticas: La ingesta prolongada de cantidades altas de ácido fólico puede disminuir la concentración de vitamina B12 en la sangre.
Precaución sobre los excipientes: Este medicamento contiene lactosa. Las personas con intolerancia hereditaria a la galactosa, deficiencia total de lactasa o dificultades para absorber glucosa o galactosa no deben usar este medicamento.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes del medicamento. Pacientes con anemia perniciosa addisoniana, por anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. El fármaco puede mejorar la anemia, sin embargo, no mejora no las alteraciones neurológicas.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.