Clonazepam, tableta, 2 mg, vía oral, código IGSS: 845

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicado en monoterapia o como complemento en el tratamiento del Síndrome de Lennox-Gastaut, en pacientes con convulsiones acinéticas y mioclónicas, en pacientes con crisis de ausencia que no han respondido a las succinamidas.
Está indicado para el tratamiento del trastorno de pánico con o sin agorafobia.

Reacciones adversas: Somnolencia, coordinación anormal, ataxia, depresión, mareos, fatiga, deterioro de la memoria, infección de las vías respiratorias superiores, confusión, disartria, rinitis, tos, frecuencia urinaria, impotencia, disminución de la libido, frecuencia no definida, aumento de la salivación, empeoramiento de las convulsiones tónico-clónicas.

Precauciones de uso: Empeoramiento de las convulsiones en pacientes en los que coexisten varios tipos de convulsiones. Pérdida de la actividad anticonvulsiva dentro de los 3 meses posteriores a su administración. Aparecimiento de reacciones paradógicas como agitación, irritabilidad, ansiedad, ira, pesadías, alucinaciones y psicosis. Precaución en pacientes con insuficiencia renal por los metabolitos excretados por vía renal. Puede producir aumento de la salivación, depresión respiratoria y aparecimiento de porfiria.

Contraindicaciones: Historia de hipersensibilidad a las benzodiacepinas. Evidencia clínica o bioquímica de enfermedad hepática significativa. Glaucoma agudo de ángulo estrecho.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.