Clorfeniramina maleato, solución inyectable, 10 mg/ml ampolla 1 ml, vía intravenosa o intramuscular, código IGSS:1346

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Alivio sintomático de las manifestaciones de origen alérgico del tracto respiratorio superior y dermatológico, como urticaria, urticaria producida por sustancias medicamentosas o por intolerancia a ciertos alimentos.

Reacciones adversas: Discrasias sanguíneas (agranulocitosis, leucopenia, anemia aplásica o trombocitopenia), con síntomas como hemorragia no habitual, dolor de garganta o cansancio, sequedad de boca, pérdida de apetito, alteraciones de gusto, molestias gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor epigástrico) que se pueden reducir con la administración junto con alimentos. colestasis, hepatitis u otros trastornos de la función hepática (con dolor de estómago o abdominal, orina oscura, etc.), pérdida de apetito, retención urinaria o dificultad al orinar, dificultad o dolor durante la micción, hipotensión, hipertensión, edema, por sobredosis: arritmias cardiacas, palpitaciones, taquicardia, depresión del sistema nervioso central con efectos como ligera somnolencia, mareo y debilidad muscular, que en algunos pacientes desaparecen tras 2-3 días de tratamiento, discinesia facial, discoordinación (torpeza), temblor, parestesias, excitación paradójica, especialmente con altas dosis y en niños o ancianos, caracterizada por inquietud, insomnio, temblores, nerviosismo, delirio, palpitaciones e incluso convulsiones, somnolencia, mareos, reacción paradójica (pesadillas, excitación, nerviosismo, etc.) más probable en niños y pacientes de edad avanzada; en estos pacientes además es más probable que se produzca confusión. otros efectos secundarios incluyen efectos anticolinérgicos (sequedad de boca, nariz y garganta, visión borrosa,

retención urinaria, estreñimiento), especialmente al comienzo del tratamiento. también puede aparecer confusión mental y euforia, sequedad de nariz y garganta, espesamiento de las mucosidades, alteraciones del olfato.
tensión en el pecho, sibilancias, aumento de la sudoración, erupciones cutáneas, aumento de la sensibilidad de la piel al sol, aumento de la sudoración.
reacciones de hipersensibilidad, reacción anafiláctica (tos, dificultad para la deglución, latidos rápidos, picor, edema de párpados o alrededor de los ojos, cara, lengua, disnea, cansancio, etc.), fotosensibilidad, sensibilidad cruzada con medicamentos relacionados, visión borrosa, diplopía, acúfenos, laberintitis aguda.
impotencia, menstruaciones irregulares.

Precauciones de uso: Generales: Los pacientes en tratamiento con antidepresivos tricíclicos o maprotilina u otros medicamentos con acción anticolinérgica deberán comunicar lo antes posible, si presentan problemas gastrointestinales, ya que podría producirse íleo paralítico.
Clorfenamina debe administrarse con precaución en pacientes de edad avanzada, ya que les pueden perjudicar especialmente la bradicardia y la reducción del caudal cardiaco. Se debe controlar la tensión arterial especialmente en estos pacientes mayores con enfermedades cardiacas. Los ancianos pueden presentar más probablemente: mareo, sedación, confusión, hipotensión o una reacción paradójica caracterizada por hiperexcitabilidad; son especialmente susceptibles a los efectos anticolinérgicos de los antihistamínicos, como sequedad de boca y retención urinaria.
Si estos efectos son continuos o graves, puede ser necesario interrumpir el tratamiento.
No se debe exceder la dosis recomendada.
Se recomienda precaución en pacientes con historial de cálculo o gota.
Debido al riesgo de depresión del sistema nervioso central se debe advertir al paciente que evite el consumo de bebidas alcohólicas o ingestión de depresores del

sistema nervioso central (barbitúricos o tranquilizantes) conjuntamente con este medicamento.
Se recomienda precaución en pacientes con ataques agudos de asma.
Se debe administrar con precaución en caso de hipertensión, enfermedades cardiovasculares graves, hipertrofia prostática, obstrucción del cuello vesical o retención urinaria, glaucoma, hipertiroidismo.
En pacientes con insuficiencia hepática y/o renal, anemia, afecciones pulmonares, úlcera péptica, diabetes, evitar tratamientos prolongados.
En algunos pacientes este medicamento puede producir somnolencia por lo que se debe informar al paciente que tenga precaución a la hora de conducir o utilizar máquinas hasta comprobar su susceptibilidad individual.
La relación riesgo-beneficio debe evaluarse en presencia de obstrucción del cuello vesical, hipertrofia prostática sintomática, predisposición a retención urinaria, glaucoma de ángulo cerrado.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.
Pacientes con enfermedades hepáticas (con insuficiencia hepática o sin ella) ó hepatitis viral (aumenta el riesgo de hepatotoxicidad).
Hipersensibilidad a bases xánticas.
Glaucoma de ángulo cerrado, hipertrofia prostática.
Pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminooxidasa.
Niños menores de seis años.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.