Clozapina, tableta de 25 mg, Vía oral, código IGSS: 896

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de pacientes con esquizofrenia gravemente enfermos que no responden adecuadamente a tratamiento antipsicótico estándar.
Reducción del riesgo de comportamiento suicida recurrente en pacientes con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo que se considera que tienen riesgo crónico de volver a experimentar una conducta suicida, según su historia y estado clínico reciente.

Reacciones adversas: Hipersalivación, sedación/somnolencia, aumento de peso, mareos, taquicardia, estreñimiento, insomnio, mareos/vértigo, náuseas, vómitos, dispepsia, hipotensión, fiebre, dolor de cabeza, temblor, síncope, sudoración, boca seca, alteraciones visuales, sueño perturbado/pesadillas, inquietud, hipocinesia/akinesia, agitación, hipertensión, malestar abdominal/ardor de estómago, convulsiones, rigidez, acatisia, confusión, leucopenia/neutropenia, fatiga, diarrea, anomalías urinarias, erupción.

Precauciones de uso: Se han producido reacciones adversas gastrointestinales graves. De identificar estreñimiento debe darse estrecha vigilancia y tratamiento.
Evalúe la afectación de órganos (p. ej., miocarditis, pancreatitis, hepatitis, colitis, nefritis). Suspenda si esto ocurre.
Posible prolongación del intervalo QT que puede ser fatal.
los fármacos antipsicóticos atípicos se han asociado con cambios metabólicos (hiperglucemia, dislipidemia, aumento de peso) que pueden aumentar el riesgo cardiovascular/cerebrovascular.

Interrumpa inmediatamente y monitorear de cerca de presentarse síndrome neuroléptico maligno.
Vigilar la hepatotoxicidad ya que puede ser mortal. Discontinuar tratamiento si hay hepatitis o elevaciones de transaminasas combinadas con otros síntomas.

De presentarse fiebre evaluar si hay infección y neutropenia.
Considere la embolia pulmonar si tiene dificultad respiratoria, dolor en el pecho, o se produce una trombosis venosa profunda.
Cuando sea posible, evite el uso con otros medicamentos anticolinérgicos y uso con precaución en pacientes con un diagnóstico actual o antecedentes de estreñimiento, retención urinaria, clínicamente significativos, hipertrofia prostática u otras condiciones en las que los efectos anticolinérgicos pueden provocar reacciones adversas importantes.
Interferencia con el rendimiento cognitivo y motor.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad (p. ej., fotosensibilidad, vasculitis, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.