Eritromicina, ungüento oftálmico, 0.5%, tubo de 3 g- 5 g, vía tópico ocular, código IGSS: 167

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de infecciones oculares superficiales, causadas por microorganismos sensibles a eritromicina.
Profilaxis de la oftalmía del recién nacido (conjuntivitis neonatal (oftalmia neonatorum) causada por Neisseria gonorreae (conjuntivitis gonocócica neonatal) o por cepas de Chlamydia trachomatis.

Reacciones adversas: Las reacciones adversas con frecuencia no definida son reacciones hipersensibles, reacciones oculares menores y enrojecimiento.

Precauciones de uso: Desechar a las 4 semanas de la primera apertura.
Administrar únicamente por vía oftálmica. Puede provocar un sobre crecimiento de microorganismos no sensibles, incluido hongos; en caso de ocurrir, suspender el tratamiento.
No se recomienda utilizar lentes de contacto durante el tratamiento de una infección ocular.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad, irritación ocular menor.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.