Formoterol fumarato, cápsula con polvo para inhalación, 12 mcg con dispositivo para inhalación, Vía inhalación, código IGSS: 509

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento mantenimiento del broncoespasmo en el asma bronquial persistente, de moderado a grave, como tratamiento complementario a los corticoesteroides inhalados.
Profilaxis del broncoespasmo inducido antes de exponerse a un estímulo alergénico conocido e inevitable.
Tratamiento broncodilatador de mantenimiento para el alivio de los síntomas en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva.

Reacciones adversas: Tremor, nerviosismo en niños de 2 a 6 años, insomnio en niños de 6 a 12 años.
Nausea, fiebre, broncoespasmo, vómitos, cefalea, mareo, tos, reacciones alérgicas, otitis media, epistaxis, aumento del apetito, infección del tracto urinario, boca seca, eructos o flatulencia, aumento de la sudoración, dolor, dispepsia, hiperactividad, escalofríos, linfadenopatia, prurito ocular, sudoración, conjuntivitis en niños de 2 a 6 años, disfonía, síndrome pseudogripal, nerviosismo.
Dolor epigástrico, epistaxis, hiperactividad en niños.
Frecuentemente no definidos:
Hipertensión, angina, vértigo, estimulación del sistema nervioso, insomnio, cefalea, acidosis metabólica, irritación de la orofaringe, hipersensibilidad, hipocalemia, aumento de los niveles de glucosa, prolongación del intervalo QT, taquicardia, urticaria, angioedema.

Precauciones de uso: Afecciones coexistentes que incluyen trastornos cardiovasculares, especialmente insuficiencia coronaria, arritmias cardíacas, hipertensión, aneurisma y feocromocitoma.

Puede producirse un broncoespasmo paradójico potencialmente mortal; suspenda el tratamiento inmediatamente.

Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad inmediata (p. ej., reacciones anafilácticas, urticaria, angioedema, erupción cutánea, broncoespasmo).

Los datos disponibles no sugieren un mayor riesgo de muerte con el uso de LABA en pacientes con EPOC

Al igual que con otros fármacos beta2-adrenérgicos inhalados, la solución para inhalación no debe utilizarse con mayor frecuencia, en dosis más altas que las recomendadas o junto con otros medicamentos que contengan agonistas beta2 de acción prolongada; puede producirse una sobredosis; se han informado efectos cardiovasculares clínicamente significativos y muertes en asociación con el uso excesivo de fármacos simpaticomiméticos inhalados.

Los medicamentos beta-agonistas pueden producir hipocalemia significativa en algunos pacientes, posiblemente a través de una derivación intracelular, que tiene el potencial de producir efectos cardiovasculares adversos; la disminución del potasio sérico suele ser transitoria y no requiere suplementación.

Los medicamentos beta-agonistas pueden producir hiperglucemia transitoria en algunos pacientes; los cambios clínicamente significativos en el potasio sérico y la glucosa en sangre fueron poco frecuentes durante los estudios clínicos con administración a largo plazo de solución para inhalación a la dosis recomendada.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Tratamiento del asma sin corticosteroides inhalados.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.