Metamizol sódico, solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml, vía IM/IV, código IGSS: 2070

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Dolor agudo intenso o crónico.

Reacciones adversas: Se han notificado reacciones adversas cutáneas graves, como el síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos, asociadas al tratamiento con metamizol.
Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Anemia aplásica, agranulocitosis y pancitopenia, incluidos casos mortales, leucopenia y trombocitopenia.
Trastornos del sistema inmunológico: Anafilaxia, reacciones anafilácticas/anafilactoides: síntomas cutáneos y de las mucosas (como picor, quemazón, eritema, urticaria, hinchazón), disnea y síntomas gastrointestinales. En casos graves: urticaria generalizada, angioedema grave (incluido el angioedema de la laringe), broncoespasmo grave, arritmia cardíaca, descenso de la presión arterial (que a veces va precedido de un aumento de la presión arterial) y shock circulatorio. Ataques de asma (en pacientes con el síndrome del asma inducido por analgésicos), Síndrome de Kounis.
Trastornos vasculares: reacciones hipotensivas aisladas. Trastornos hepatobiliares: Lesión hepática inducida por fármacos, incluida hepatitis aguda, ictericia, aumento de las enzimas hepáticas.
Trastornos renales y urinarios: Empeoramiento de la insuficiencia renal. Nefritis intersticial y reacciones en el lugar de inyección.

Precauciones de uso: Aconsejar a los pacientes que acudan inmediatamente al médico si presentan signos y síntomas que sugieran alteraciones hemáticas (p. ej., debilidad general, infección, fiebre persistente, hematomas, hemorragias, palidez) durante el tratamiento con metamizol debido al riesgo de pancitopenia. Se han notificado reacciones adversas cutáneas graves, como síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos, que pueden ser potencialmente mortales o graves, de aparecer suspender el tratamiento. Prescribirse con precaución en pacientes asmáticos o atópicos.

La administración parenteral está asociada a un mayor riesgo de reacciones anafilácticas o anafilactoides. Suspender si aparecen signos. Reacciones anafilácticas graves l en los siguientes pacientes: pacientes con asma bronquial, en particular con rinitis polipoidea concurrente.

Pacientes con urticaria crónica. Pacientes con intolerancia al alcohol, es decir, aquellos que reaccionan incluso a pequeñas cantidades de alcohol con síntomas como, estornudos, lagrimeo y eritema facial. Una intolerancia al alcohol puede ser síntoma de un síndrome de asma por analgésicos no diagnosticado previamente.

Pacientes con intolerancia a colorantes (p. ej., tartrazina) o a conservantes (p. ej., benzoatos)

Puede provocar reacciones de hipotensión aisladas y parecen depender de la dosis y es más probable que se produzcan tras la administración parenteral.

Casos de hepatitis aguda de patrón predominantemente hepatocelular en pacientes tratados con metamizol, con aparición de pocos días a pocos meses después del inicio del tratamiento. Los signos y síntomas incluyen el aumento de las enzimas hepáticas en suero con o sin ictericia, con frecuencia en el contexto de otras reacciones de hipersensibilidad al fármaco (p.ej., erupción cutánea, discrasias sanguíneas, fiebre y eosinofilia) o acompañado de características de hepatitis autoinmunitaria.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo, a otras pirazolonas (p. ej., fenazona, propifenazona) o pirazolidinas (p. ej., fenilbutazona, oxifenbutazona), incluida la experiencia previa de agranulocitosis tras la administración de algunas de estas sustancias, o a alguno de los excipientes. Hipotensión o hemodinámica inestable. Deterioro de la funcionalidad de la médula ósea (p. ej., después de la quimioterapia) o trastorno de la hematopoyesis.
Asma por analgésicos o intolerancia conocida a los analgésicos del tipo urticaria-angioedema, es decir, pacientes que experimentan la aparición de broncoespasmo u otras reacciones anafilactoides (p. ej., urticaria, rinitis, angioedema).
Tras la administración de salicilatos, paracetamol u otros analgésicos no narcóticos, como el diclofenaco, el ibuprofeno, la indometacina o el naproxeno. Porfiria hepática aguda intermitente.
Defectos congénitos de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (riesgo de hemólisis); durante el tercer trimestre de embarazo.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.