Policresuleno, óvulos vaginales, 90 mg con aplicador, Vía vaginal, código IGSS: 1005

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Como auxiliar en colposcopia: Como hemostático y cicatrizante después de biopsias, conización, extirpación de pólipos cervicales, ectropión; post electrocoagulación y crioterapia; quistes de Naboth etc.
Tratamiento de erosiones del cérvix y vagina.
Colporrafia, episiorrafias, perinorrafia, desgarros.
Infecciones vaginales y cervicales causadas por bacterias, tricomonas y o cándida albicans.
Flujo por vaginitis y cervicitis de etiología inespecífica.

Reacciones adversas: Sequedad vaginal, sensación de quemazón local en el área de aplicación, eliminación de tejido mucoso, candidiasis vaginal, prurito vulvar, disconfort vaginal, sensación de cuerpo extraño en la vagina.

Precauciones de uso: No es eficaz contra infecciones como el VIH u otra enfermedad de transmisión sexual (gonorrea, sífilis, etc.).
Durante el periodo de tratamiento es necesario abstenerse de lavados genitales con jabones irritantes, así como de la actividad sexual.
No debe aplicarse durante la menstruación.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
No debe ser utilizado en menores de 18 años o mujeres postmenopáusicas.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.