Selegilina, tableta, 5 mg, vía oral, código IGSS: 827

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Coadyuvante en el manejo de pacientes parkinsonianos tratados con levodopa/carbidopa que presentan deterioro en la calidad de su respuesta a esta terapia.

Reacciones adversas: Discinesia, náuseas, dolor abdominal, boca seca.

Precauciones de uso: La selegilina no debe usarse en dosis diarias que excedan las recomendadas (10 mg/día) debido a los riesgos asociados con la inhibición no selectiva de la monoaminooxidasa.
Se ha informado toxicidad grave del sistema nervioso central asociada con hiperpirexia y muerte con la combinación de antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la monoaminooxidasa no selectivos.
Reacciones graves, a veces mortales, con signos y síntomas que pueden incluir hipertermia, rigidez, mioclono, inestabilidad autonómica con fluctuaciones rápidas de los signos vitales y estado mental.
Se han informado cambios que incluyen agitación extrema que progresa hasta delirio y coma con pacientes que reciben una combinación de clorhidrato de fluoxetina e inhibidores de la monoaminooxidasa no selectivos.
No combinar selegilina y antidepresivos triciclicos.
Mayor riesgo de desarrollar melanoma.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Uso concomitante de opioides (p. ej., meperidina y derivados, metadona o tramadol) y otros inhibidores de la monoaminooxidasa, incluidos los inhibidores selectivos de

la monoaminooxidasa -B u otros fármacos de la clase monoaminooxidasa, incluido linezolid, un antibacteriano de oxazolidinona
Dentro de los 14 días posteriores a la toma de opioides, otro inhibidor de la monoaminooxidasa u otros medicamentos de la clase monoaminooxidasa
Uso concomitante de hierba de San Juan o ciclobenzaprina (un relajante muscular tricíclico).
Uso concomitante de dextrometorfano.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.