Terbinafina, tableta, 250 mg, vía oral, código IGSS: 1308

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de infecciones fúngicas en la piel, cuero cabelludo y uñas como: tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis, tinea capitis, onicomicosis.

Reacciones adversas: Angioedema, desorientación, mareo, erupción maculopapular pruriginosa, erupción, hiperamonemia, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica toxica, urticaria, hemorragia gastrointestinal, edema laríngeo, agranulocitosis, leucopenia, neutropenia, pancitopenia, trombocitopenia, púrpura trombocitopénica, Hepatotoxicidad, insuficiencia hepática, nefrotoxicidad, neumonitis, anafilactoide.

Precauciones de uso: Antes de utilizar terbinafina se recomienda valorar la función hepática del paciente y realizar controles periódicos cada 4 a 6 semanas después del inicio del tratamiento. Se debe interrumpir completamente el tratamiento si se observa alteraciones en la función hepática.
Se debe vigilar al paciente por efectos dermatológicos y suspender inmediatamente el tratamiento si se produce alguna erupción cutánea progresiva. Se debe utilizar con precaución en pacientes con psoriasis o lupus eritematoso sistémico. No se recomienda el uso del medicamento en pacientes con función renal alterada (creatinina serica mayor a 300 micromoles/litro.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo, insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática grave.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.