Bosentan, tableta, 125 mg, vía oral, código IGSS: 1367

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar:
En adultos para mejorar la capacidad de ejercicio y disminuir el empeoramiento clínico.
En pacientes pediátricos de 3 años y mayores con hipertensión arterial pulmonar idiopática o congénita para mejorar resistencia vascular pulmonar, que se espera que resulte en una mejora en capacidad de ejercicio.

Reacciones adversas: Hemoglobina disminuida; >1g/dl, infección del tracto respiratorio, dolor de cabeza, edema, nasofaringitis, enrojecimiento, hipotensión, dolor en el pecho, síncope, hipotensión, sinusitis, artralgia, aspartatoaminotransferasa/alaninaaminotransferasa anormal, palpitaciones, anemia.

Precauciones de uso: Puede ocasionar retención de líquidos que puede requerir intervención.
Si hay signos de enfermedad pulmonar, si se produce edema, considerar el diagnóstico de enfermedad venooclusiva pulmonar asociada y considerar suspender el tratamiento.
Puede existir disminución del recuento de espermatozoides.
Controlar los niveles de hemoglobina.
después de 1 y 3 meses de tratamiento, luego cada 3 meses a partir de entonces por posibles disminuciones de hemoglobina y hematocrito.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad, embarazo**,** uso concomitante de ciclosporina o glibenclamida.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.