Hidroxicloroquina sulfato, tableta, 400 mg, vía oral, código IGSS: 934

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Pacientes adultos y pediátricos para: Tratamiento del paludismo no complicado debido a Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax y Plasmodium ovale.
Profilaxis de la malaria en áreas geográficas donde no se reporta resistencia a la cloroquina.
Tratamiento de la artritis reumatoide aguda y crónica en adultos.
Tratamiento del lupus eritematoso sistémico en adultos.
Tratamiento del lupus eritematoso discoide crónico en adultos.

Reacciones adversas: Trastornos de la sangre y del sistema linfático: insuficiencia de la médula ósea, anemia, anemia aplásica, agranulocitosis, leucopenia y trombocitopenia; hemólisis informada en personas con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, miocardiopatía, prolongación del intervalo qt y arritmias ventriculares y torsade de pointes**,** vértigo, tinnitus, nistagmo, sordera nerviosa, sordera, retinopatía irreversible con cambios en la pigmentación de la retina (aspecto de ojo de buey), defectos del campo visual (escotomas paracentrales) y alteraciones visuales (agudeza visual), maculopatías (degeneración macular), disminución de la adaptación a la oscuridad, anomalías en la visión del color, cambios en la córnea (edema y opacidades) incluido el depósito de fármaco en la córnea con o sin síntomas acompañantes (halo alrededor de las luces, fotofobia, visión borrosa), náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, fatiga, pruebas de función hepática anormales, insuficiencia hepática aguda, urticaria, angioedema, broncoespasmo, disminución del apetito, hipoglucemia, porfiria, disminución de

peso, trastorno sensoriomotor, miopatía del músculo esquelético o neuromiopatía que provoca debilidad progresiva y atrofia de los grupos musculares proximales, depresión de los reflejos tendinosos y conducción nerviosa anormal, cefalea, mareos, convulsiones, ataxia y trastornos extrapiramidales como distonía, discinesia, temblor, afecto/labilidad emocional, nerviosismo, irritabilidad, pesadillas, psicosis, conducta suicida, erupción cutánea, prurito, alteraciones de la pigmentación de la piel y las mucosas, cambios de coloración del cabello, alopecia; dermatitis erupciones ampollosas que incluyen eritema multiforme, síndrome de stevens-johnson y necrólisis epidérmica tóxica, reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos (síndrome dress), fotosensibilidad, dermatitis exfoliativa, pustulosis exantemática aguda generalizada (pega).

Precauciones de uso: Se informaron cardiomiopatía y arritmias ventriculares mortales o potencialmente mortales.

Toxicidad retinal: el daño irreversible de la retina está relacionado con dosis y duración del tratamiento. Se recomienda examen de retina inicial y exámenes durante el tratamiento.

Reacciones cutáneas graves como síndrome de Stevens Johnson, necrólisis epidermica tóxica, reacción al fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos, pustulosis exantemática aguda generalizada han sido reportados.

Empeoramiento de la psoriasis y la porfiria por lo que es importante evitar en pacientes con psoriasis o porfiria.

Toxicidad hematológica como mielosupresión, suspender si ocurre.

Hemolisis ha sido reportada en pacientes con deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa.

Han sido reportados miopatía o neuropatía del músculo esquelético que conduce a debilidad progresiva y atrofia de grupos musculares proximales, reflejos tendinosos deprimidos y conducción nerviosa anormal.

Casos de comportamientos suicidas han sido reportados en pacientes con hidroxicloroquina.

Puede causar hipoglucemia grave y potencialmente mortal, en presencia o ausencia de agentes antidiabéticos.
Proteinuria con o sin reducción moderada de la tasa de filtración glomerular ha sido reportada. Considere la fosfolipidosis como una posible causa de insuficiencia renal, en pacientes con trastornos subyacentes del tejido conjuntivo. Discontinuar si se sospecha o demuestra toxicidad renal por biopsia.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida a los derivados de la 4-aminoquinolina.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.