Riociguat, tableta, 1 mg, vía oral, código IGSS: 2117

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de adultos con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica persistente/recurrente después del tratamiento quirúrgico, o hipertensión pulmonar tromboembólica crónica inoperable, para mejorar la capacidad de ejercicio y clase funcional de la organización mundial de la salud.
Tratamiento de adultos con hipertensión arterial pulmonar para mejorar la capacidad de ejercicio, la clase funcional de la organización mundial de la salud y retrasar el empeoramiento clínico.

Reacciones adversas: Dolor de cabeza, Dispepsia y gastritis, Mareos, Náuseas, Diarrea, Hipotensión, Vómitos, Anemia, Enfermedad por reflujogastroesofágico, Estreñimiento, Sangrado grave, Hemoptisis.

Precauciones de uso: Puede causar Toxicidad embriofetal cuando se administra a una mujer embarazada y está contraindicado en mujeres embarazadas. Asesorar a las mujeres sobre el riesgo potencial para el feto. Obtenga una prueba de embarazo antes del inicio del tratamiento, mensualmente durante el tratamiento y durante un mes después de suspender el tratamiento.
Considere la posibilidad de hipotensión o isquemia sintomática en pacientes con hipovolemia, obstrucción severa del flujo de salida del ventrículo izquierdo, hipotensión en reposo, disfunción autonómica o tratamiento concomitante con antihipertensivos o inhibidores potentes de CYP y glucoproteína P / proteína de resistencia al cáncer de mama.
Los vasodilatadores pulmonares pueden empeorar significativamente el estado cardiovascular de los pacientes con enfermedad venooclusiva pulmonar.

Contraindicaciones:

Embarazo: Administración concomitante con nitratos u donantes de óxido nítrico (p. ej., nitrito de amilo), inhibidores de la fosfodiesterasa (p. ej., avanafil, sildenafil, tadalafil, vardenafil) o inhibidores de la fosfodiesterasa no específicos (p. ej., dipiridamol, teofilina) debido a la hipotensión aditiva.

Administración dentro de las 24 h de sildenafilo.

Uso concomitante de otros estimuladores de guanilato ciclasa soluble.

Tadalafil 24 h antes o dentro de las 48 h posteriores a riociguat.

Pacientes con hipertensión pulmonar asociada a neumonía intersticial idiopática.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.