Pirimetamina/ Sulfadoxina, tableta, 25 mg/ 500 mg, vía oral, código IGSS: 147

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la malaria aguda, no complicada, por P. falciparum resistente a cloroquina:
Actualmente, la mayoría de las cepas de P. falciparum resistentes a cloroquina suelen serlo también a pirimetamina-sulfadoxina. Por esta razón esta indicación se encuentra en desuso en muchos países, aunque todavía puede utilizarse, siempre combinado con otro fármaco, en algún país de África subsahariana o Sudamérica.
Profilaxis frente a malaria.
Actualmente no se recomienda de forma rutinaria y únicamente se puede considerar en viajeros a zonas donde el paludismo por P. falciparum resistente a cloroquina es endémico y sensible a pirimetamina-sulfadoxina y no puede utilizarse otro fármaco como profilaxis antipalúdica.

Reacciones adversas: Calambres abdominales, pigmentación anormal de la piel, anafilaxia, anorexia, arritmias (grandes dosis), glositis atrófica, depresión, fiebre, insomnio, aturdimiento, malestar, convulsiones, dermatitis, eritema multiforme, erupción, síndrome de stevens-johnson, vómitos, diarrea, xerostomía, anemia megaloblástica, leucopenia, pancitopenia, trombocitopenia, eosinofilia pulmonar, neutropenia, las muertes asociadas con la administración de sulfonamidas, aunque raras, se han se producido debido a reacciones graves, que incluyen necrosis hepática fulminante, agranulocitosis, anemia aplásica y otras situaciones sanguíneas, se ha informado que causa leucopenia durante un tratamiento de 2 meses o más, esta leucopenia es generalmente leve y reversible.

Precauciones de uso: Usar con precaución en pacientes con deficiencia de G6PD. Usar con precaución en insuficiencia hepática/renal y antecedentes de trastornos convulsivos.

Tiene una ventana terapéutica estrecha; si se desarrollan signos de deficiencia de folato, reduzca la dosis o suspenda el medicamento según la respuesta del paciente; El ácido folínico (leucovorina) debe administrarse en dosis de 5 a 15 mg al día (por vía oral, IV o IM) hasta que se restablezca la hematopoyesis normal.

Se han notificado anemia megaloblástica, leucopenia, trombocitopenia, neutropenia y pancitopenia con dosis altas; controlar el hemograma completo y las plaquetas dos veces por semana en pacientes que reciben terapia de dosis alta.

Tenga precaución en pacientes con posible deficiencia de folato, incluido el embarazo, el síndrome de malabsorción y el alcoholismo.

Administrar con leucovorina, especialmente en dosis altas, para prevenir complicaciones hematológicas debido a la deficiencia de ácido fólico inducida por pirimetamina; continuar con leucovorina durante el tratamiento y durante 1 semana después de suspender el tratamiento.

La aparición de fiebre, tos, dificultad respiratoria y púrpura asociados con la toma de pirimetamina-sulfadoxina pueden constituir los primeros signos de una reacción cutánea grave, obligando a suspender inmediatamente el tratamiento.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a pirimetamina o sulfadoxina o a los excipientes de la composición. Las dosis repetidas en profilaxis están contraindicadas si Insuficiencia hepática o renal grave o discrasias sanguíneas. Anemia megaloblástica por déficit de folatos.

Niños menores de 2 meses o 5 kg ya que podrían presentar problemas en la glucuronización hepática y kernicterus. Hipersensibilidad y anemia megaloblástica o por deficiencia de folato.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.