Nifedipino, tableta de liberación modificada (osmótica), 30 mg, vía oral, código IGSS: 2108

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la angina vasoespástica confirmada por cualquiera de los siguientes criterios:
Patrón clásico de angina en reposo acompañada de elevación del segmento ST.
Angina o espasmo de la arteria coronaria provocado por ergonovina.
Espasmo de la arteria coronaria angiográficamente demostrado.
Tratamiento de la angina estable crónica (angina asociada al esfuerzo) sin evidencia de vasoespasmo en pacientes que permanecen sintomáticos a pesar de una adecuada dosis de betabloqueantes y/o nitratos orgánicos o que no pueden tolerar esos agentes. Solo o en combinación para el tratamiento de la hipertensión, para reducir la presión arterial.

Reacciones adversas: Edema periférico, Mareos, Enrojecimiento, Dolor de cabeza, Acidez estomacal, Náuseas, Calambres musculares, Cambio de humor, Nerviosismo, Tos, Disnea, Palpitaciones, Sibilancias, Hipotensión transitoria, Urticaria, Prurito, Estreñimiento, Dolor en el pecho.

Precauciones de uso: No administrar con jugo de toronja.
Se recomienda el control de la presión arterial durante la administración inicial y la titulación de nifedipino.
sugirió. Se recomienda especialmente una observación estrecha para los pacientes que ya toman medicamentos.
que se sabe que reducen la presión arterial, edema periférico de leve a moderado de manera dependiente de la dosis con incidencia que oscila entre aproximadamente el 10% y 30% con la dosis más alta estudiada.

Se debe tener cuidado para diferenciar este edema periférico de los efectos del aumento de la disfunción ventricular izquierda.
Adherencia del comprimido a la pared gastrointestinal con ulceración, algunos requiriendo hospitalización e intervención.
Posible síndrome de abstinencia en pacientes con retiro abrupto de betabloqueantes.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la nifedipina u otros bloqueadores de los canales de calcio.
Shock cardiogénico.
La administración concomitante con inductores potentes de CYP3A4 (p. ej., rifampicina, rifabutina, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, hierba de San Juan) reduce significativamente la eficacia de la nifedipina.
Preparación de liberación inmediata (por vía sublingual u oral) para la hipertensión urgente o emergente.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.