Cinacalcet clorhidrato, tableta 30 mg, vía oral, código IGSS: 10575

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento del hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia renal crónica en diálisis en adultos y niños de 3 años en adelante.
Tratamiento de la hipercalcemia en adultos con carcinoma de tiroides o hiperparatiroidismo primario que no puede ser tratada con paratiroidectomía aun cuando esta esté indicada según sus niveles séricos de calcio.

Reacciones adversas: Diarrea, nausea, vómitos, mialgia, mareo, hipertensión, anorexia, astenia, dolor de pecho no cardiaco, convulsiones**,** hipotensión, enfermedad ósea adinámica, sangrado gastrointestinal, condrocalcinosis pirofosfato (pseudogota aguda).

Precauciones de uso: No se debe utilizar en pacientes con insuficiencia renal crónica que no estén en diálisis debido al riesgo de hipocalemia.
La disminución de los niveles séricos de calcio puede causar parestesias, mialgias, espasmos musculares, tetania y convulsiones, incluso en pacientes pediátricos.
Se han reportado casos de hemorragia gastrointestinal, principalmente superior, en pacientes que consumen calciomiméticos.
La disminución en los niveles séricos de calcio puede prolongar el intervalo QT y causar arritmias ventriculares.
Se debe educar a todos los pacientes sobre los síntomas de la hipocalcemia para que puedan ser notificados a un médico inmediatamente. Todos los pacientes deberían llevar una monitorización estrecha de los niveles de calcio sérico especialmente al inicio del tratamiento o después de un ajuste de dosis.

Se debe vigilar a todos los pacientes que administren cualquier medicamente que reduzca el calcio sérico de manera concomitante.
Los pacientes que utilizan cinacalcet no deberían recibir etalcalcetida.
Los pacientes con insuficiencia hepática moderada a grave pueden no metabolizar de mancera adecuada el fármaco por lo cual se debe usar con precaución.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Niveles de calcio sérico por debajo de los límites normales.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.