Rifampicina, suspensión, 100 mg/5 ml, frasco 120 ml, vía oral, código IGSS: 70

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tuberculosis en todas sus formas (en asociación con otros agentes tuberculostáticos).
Brucelosis: Erradicación de meningococos en portadores asintomáticos, no enfermos (no está indicado en el tratamiento de la infección meningocócica establecida).
Infecciones en las que se ha demostrado previamente la sensibilidad a rifampicina, y cuando no fuera oportuno administrar al paciente otros antibióticos o quimioterápicos, bien por ser alérgico existir alguna contraindicación que no los hiciera aconsejables.

Reacciones adversas: Pirexia, escalofríos, Trombocitopenia, con o sin púrpura, normalmente asociado con tratamientos intermitentes, pero es reversible si la rifampicina se suspende en cuanto aparece la púrpura, cefalea, mareos, náuseas, vómitos, reacción paradójica al medicamento, elevación de la bilirrubina en sangre, elevación del aspartato aminotransferasa, elevación de la alanina aminotransferasa.

Precauciones de uso: Puede dificultar el manejo de los pacientes con diabetes mellitus. En pacientes con alteraciones hepáticas se recomienda un control cuidadoso de la función hepática, en especial de la alanino aminotransferasa y del aspartato aminotransferasa séricas, que deberán determinarse antes del tratamiento y, posteriormente, cada 2-4 semanas durante el mismo. Si se presentaran signos o síntomas de lesión hepatocelular, se deberá interrumpir el tratamiento con rifampicina. Casos de colestasis de leve a grave con el tratamiento.

Reacciones de hipersensibilidad sistémica graves, incluso casos mortales, como el síndrome de reacción a fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos. Si no se puede establecer una etiología alternativa para los signos y síntomas. Reacciones cutáneas ampollosas graves, como síndrome de Stevens Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y pustulosis exantemática generalizada aguda, de aparecer suspender tratamiento con rifampicina.
Puede causar coagulopatía dependiente de vitamina K y sangrado grave. Casos de enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis en pacientes que reciben rifampicina para el tratamiento de la tuberculosis. Puede causar una decoloración (amarilla, naranja, roja, marrón) de dientes, orina, sudor, esputo, lágrimas y heces carente de significación, y frente a la cual es conveniente avisar previamente al paciente. Igualmente puede provocar una coloración permanente en las lentes de contacto blandas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes. Pacientes con enfermedad hepática activa. En combinación con: la asociación saquinavir/ritonavir o elvitegravir/cobicistat , Atazanavir, darunavir, fosamprenavir, tipranavir, rilpivirina o dolutegravir/rilpivirina. Nifedipino, nimodipino, nisoldipino o nitrendipino. Glecaprevir/pibrentasvir o elbasvir/grazoprevir. Voriconazol. Artemetero/lumefantrina. BCG cultivo vivo desecado (interferón).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.