Isoniazida, tableta, 100 mg, vía oral, código IGSS: 44

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de todas las formas de tuberculosis. Profilaxis de la tuberculosis.

Reacciones adversas: Hepatitis, rash, náuseas, vómitos, fatiga, vértigo, estreñimiento, parestesia de las extremidades inferiores, somnolencia, cefaleas y neuritis periférica en pacientes desnutridos. hipersensibilidad, fiebre, linfadenopatía, vasculitis, convulsiones, reacciones psicóticas, neuritis optica, agranulocitosis, eosinofilia, trombocitopenia, anemia (esta última por deficiencia de piridoxina), hiperreflexia, xerostomia y trastornos renales.

Precauciones de uso: Antes y durante la terapéutica isoniazidica deben ser adecuadamente controlados los desórdenes convulsivos y trastornos psiquiátricos (psicosis), la insuficiencia renal y hepática.
Pueden aparecer reacciones hematológicas, tales como agranulocitosis, eosinofilia, trombocitopenia, anemia (esta última por deficiencia de piridoxina).
Deben suministrarse profilácticamente 6 mg de piridoxina (vitamina B6) por día para evitar las reacciones neurológicas indeseables, así como casi todas las reacciones de disfunción del sistema nervioso que puedan aparecer en el curso del tratamiento.
Suministrar piridoxina a pacientes diabéticos y alcohólicos que se traten con isoniazida.

Los pacientes que reciben la isoniazida deben ser cuidadosamente evaluados a intervalos mensuales en busca de síntomas de hepatitis (anorexia, malestar, fatiga, nauseas e ictericia), así como revisar mensualmente la actividad de la transaminasa glutámica oxalacetica sérica. Se plantea que una elevación mayor del triple del valor normal justifica la suspensión de la droga. Es necesario informar al médico rápidamente si se presentan signos de hepatitis o neuritis periférica.
Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos que contengan tiraminas (quesos, vinos rojos). La ingestión con alimentos reduce la absorción de isoniazida.
Realizar exámenes oftalmológicos periódicos. Pacientes con diabetes mellitus.

Contraindicaciones: Antecedentes de hipersensibilidad a la isoniazida, trastornos neuro-musculares.
Pacientes con daño hepático severo o daño hepático asociados a la isoniazida.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.