Pirazinamida, tableta, 500 mg, vía oral, código IGSS: 59

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento inicial de la tuberculosis, en combinación con otros agentes antituberculosos, conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Reacciones adversas: Malestar, náuseas, vómitos, anorexia, artralgia, mialgia, fiebre, erupción, picor, acné, fotosensibilidad, gota, disuria, porfiria, trombocitopenia, hepatotoxicidad, nefritis intersticial.

Precauciones de uso: Evaluar la función hepática antes del inicio y durante el tratamiento especialmente en pacientes con antecedentes de enfermedad hepática. El tratamiento con pirazinamida en pacientes con diabetes mellitus puede modificar los niveles de glucosa en sangre, por lo que se recomienda el seguimiento estrecho de estos pacientes. Puede incrementar los niveles plasmáticos de ácido úrico (por inhibición de la excreción renal de uratos), causando hiperuricemia y exacerbación de la clínica de artritis gotosa. Si se produce hiperuricemia acompañada de artritis gotosa aguda, se recomienda suspender el tratamiento con pirazinamida y considerar esquemas terapéuticos que no incluyan este fármaco. Falsos positivos en prueba de detección de cetonas en orina.

Contraindicaciones: Daño hepático severo (insuficiencia hepática), insuficiencia renal, gota aguda (hiperuricemia), porfiria, hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.