Etambutol clorhidrato, tableta, 400 mg, vía oral, código IGSS: 42

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Adultos y niños a partir de 3 meses de edad para el tratamiento de las siguientes infecciones:
Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar primaria y retratamiento Tuberculosis latente.

Reacciones adversas: Gota aguda o hiperuricemia, dolor abdominal, anafilaxia, anorexia, confusión, desorientación, fiebre, dolor de cabeza, anormalidades de pruebas de función hepática, malestar, náuseas, neuritis óptica; los síntomas pueden incluir disminución de la agudeza, daltonismo o defectos visuales (generalmente reversibles con la interrupción, aunque se ha informado ceguera irreversible), neuritis periférica, prurito, erupción, vómitos.

Precauciones de uso: Se recomienda que los pacientes (niños y adultos) se sometan a una revisión oftalmológica completa antes de comenzar el tratamiento y periódicamente durante el mismo, especialmente si se utilizan dosis elevadas.
Revisar la función renal del paciente antes del inicio de tratamiento.
Posible hiperuricemia. El tratamiento concomitante con isoniacida o piridoxina puede potenciar aumento de la concentración sérica de ácido úrico.
Posible hepatotoxicidad, descritos como casos aislados.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad
Neuritis óptica conocida (a menos que el juicio clínico determine que se puede usar)
Pacientes incapaces de apreciar e informar efectos secundarios visuales o cambios en la visión (p. ej., niños pequeños, pacientes inconscientes).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.